

GUÍA DE CAMPO PARA OBSERVADORES DE AVES EN LA REGIÓN DE SAMANÁ



Esta publicación ha sido posible gracias al apoyo de :

PRONATURA

PROGRAMA DE PEQUEÑOS SUBSIDIOS

**DEL FONDO MUNDIAL PARA EL MEDIO AMBIENTE
PPS/FMAM**

**PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO
PNUD**



PRONATURA



FMAM



**GUÍA DE CAMPO
PARA OBSERVADORES DE AVES
EN LA REGIÓN DE SAMANÁ**

Publicación Educativa sin fines de lucro

**Centro para la Conservación y Ecodesarrollo
de la Bahía de Samaná y su Entorno, Incorporado.
CEBSE, INC.**

Organización privada, sin fines de lucro.

Compilación, traducción y redacción:

Patricia Lamelas, Carlotta Ventura, Suranahí Buglass, Ingrid Pren

Diseño y Diagramación:

Patricia Lamelas

Ilustraciones e información obtenidas en su mayoría de:

A Guide to the Birds of the West Indies / Herbert Raffaele ... [et al.]

primarily illustrated by Tracy Pedersen, Kristin Williams ;

with supporting illustrations by Don Radovich ... [et al.].

ISBN 0-691-08736-9

Con el consentimiento de:

PRINCETON UNIVERSITY PRESS


Permissions Department

41 William Street

Princeton, NJ 08540-5237

Prohibida la reproducción, total o parcial sin autorización previa de:

CEBSE, INC.



Para La Observación de Aves ...

- ◇ Las mejores horas para observarlas son las primeras de la mañana y las últimas de la tarde, momentos en que las aves buscan alimentos o sitios para dormir.
- ◇ Es recomendable la salida en grupos pequeños de personas.
- ◇ Una forma de observarlas es encontrar un lugar tranquilo donde pueda sentarse y confundirse con el ambiente.
- ◇ Para no molestarlas mientras las observamos: nuestra vestimenta debe ser discreta y evitar el uso de colores muy llamativos.
- ◇ No gritar ni hacer ruido. Sus movimientos deben ser sigilosos. Observe bien donde pisa y no corra detrás de ellas.
- ◇ No tocar los nidos ni acercarse demasiado.
- ◇ Calzar zapatos cómodos e impermeables, llevar repelente contra insectos, etc.
- ◇ Si no conoce bien el terreno, procure llevar un guía local.

Equipos y Materiales Recomendados

- ⇒ Guía de aves
- ⇒ Binoculares
- ⇒ Sombrero / Gorra
- ⇒ Libreta y Lápiz
- ⇒ Cámara Fotográfica y/o de Video (opcional)



Familia: *Anatidae*

Nombre Científico: *Anas bahamensis*

Nombre Común: *Pato de la Orilla*

Mide de 38-48 cm (15-19"). Es notable la marca roja en su pico y sus mejillas blancas. Las plumas secundarias bajo sus alas, son verdes con bordes color crema. Se alimenta sobrevolando y capturando los peces desde la superficie del agua. Esta especie está considerada como amenazada debido a su caza indiscriminada, la destrucción de su hábitat y la predación de sus nidos. Habita en cuerpos de agua fresca e hipersalina. Pone de 5 a 12 huevos de color ligeramente bronceado. Se reproduce de febrero a junio, pero el período varía dependiendo de la pluviosidad y la disponibilidad de alimentos.





Familia: *Anatidae*

Nombre Científico: *Anas discors*

Nombre Común: *Pato de la Florida*

Mide de 38-40 cm (15-16"). Se caracteriza por sus alas azules que pueden observarse durante el vuelo y su pequeño tamaño para ambos sexos y plumaje. El macho y la hembra en período no reproductivo son moteados de marrón, con las plumas secundarias bajo sus alas de color verde . Esta es el ave de alas azules mas típica en plumaje de todas las Antillas. El macho en período de reproducción, se distingue por su marca con forma de media luna blanca en la cara. El numero de su población ha disminuido notablemente. Habita en áreas de aguas superficiales frescas, asi como en cuerpos de agua salobre.





Familia: *Anatidae*

Nombre Científico: *Aythya affinis*

Nombre Común: *Pato Turco*

Mide de 38-46 cm (15-18"). El macho se distingue por tener la cabeza, el pecho y la cola negras, mientras su espalda y costados son de color blanco. La hembra es marrón con una larga marca blanca sobre el pico. En el vuelo para ambos sexos, las plumas secundarias son blancas y las primarias son oscuras. Viajan típicamente en bandadas. Su población ha disminuido notablemente desde 1950 a 1960. Habita en amplios cuerpos de agua tanto frescos como salinos.





Familia: Anatidae

Nombre Científico: *Dendrocygna arborea*

Nombre Común: Yaguaza

Mide de 48-56 cm (19-22"). Se distingue por su coloración marrón oscura, su abdomen con marcas negras, su cuello largo y su posición erecta. Cuando vuela se ve negra por completo, con el abdomen moteado y la cubierta superior de las alas color gris. Vuela inclinando la cabeza y extiende las patas mas allá de la cola. Su canto particular suena como -chiriria-. En nuestro país, alguna vez fue común, pero ahora se encuentra amenazada debido a la destrucción de su hábitat y la captura sin control. Es difícil de observar debido a sus hábitos nocturnos. Habita en manglares, en sabanas, ciénegas forestadas, lagunas y tierras altas. Pone de 4 a 16 huevos blancos.





Familia: Anatidae

Nombre Científico: *Dendrocygna arborea*

Nombre Común: Yaguaza

Mide 31-36 cm. (12-14 pulgadas). Es un pato pequeño de color marrón rojizo. La cabeza se distingue por tener la cara y parte de la corona negros haciendo relucir el pico azul celeste. La espalda es marrón rojiza, con manchas negras. Las alas son color marrón con alas secundarias blancas, visibles durante el vuelo. La hembra posee la espalda estriada. El mejor rasgo de diferenciación es su cara, en la cual tiene dos líneas cruzando a través y bajo el ojo respectivamente. Habita en cuerpos de agua dulce donde haya vegetación flotante. Ponen de 3 a 4 huevos blanco-amarillentos, a veces con un tinte azul pálido. Se desconoce su época de reproducción.





Familia: Anatidae

Nombre Científico: *Oxyura jamaicensis*

Nombre Común: Pato Espinoso, Rojizo

Mide de 35-43 cm (14-17"). Su cola frecuentemente está erecta. El macho es de coloración rojiza-marrón por completo, con manchas blancas con puntos negros en sus mejillas y pico azul. La hembra joven es principalmente marrón claro con una raya marrón debajo del ojo. En el vuelo aparece con una cola relativamente larga y las plumas superiores de las alas más oscuras. Sus hábitats son predominantemente profundos, en cuerpos abiertos de agua fresca, pero también frecuenta lagunas salobres. Pone de 4 a 12 huevos blancos y muy largos, reproduciéndose desde junio hasta agosto.





Familia: Trochilidae

Nombre Científico: *Anthracothorax dominicus*

Nombre Común: Zumbador grande

Mide 31-36 cm. (12-14 pulgadas). Es un pato pequeño de color marrón rojizo. La cabeza se distingue por tener la cara y parte de la corona negros haciendo relucir el pico azul celeste. La espalda es marrón rojiza, con manchas negras. Las alas son color marrón con alas secundarias blancas, visibles durante el vuelo. La hembra posee la espalda estriada. El mejor rasgo de diferenciación es su cara, en la cual tiene dos líneas cruzando a través y bajo el ojo respectivamente. Habita en cuerpos de agua dulce donde haya vegetación flotante. Ponen de 3 a 4 huevos blanco-amarillentos, a veces con un tinte azul pálido. Se desconoce su época de reproducción.





Familia: Trochilidae

Nombre Científico: *Chlorostiboni swainsonni*

Nombre Común: Zumbador verde, Zumbaflor

Mide 10.5cm (4"). Se distingue por su plumaje verde, pecho con coloración negra, mandíbula rosada y cola invertida (forma Û). La hembra tiene el plumaje superior verde, el abdomen grisáceo con los lados de color verde metálico y las puntitas de la cola blancas. Su sonido es una serie de -tics, tic,tic,tic-. es endémico de la hispaniola, común en las montañas pero raro en elevaciones bajas. Es considerado amenazado en Haití debido a la destrucción del hábitat. Habita en bosques húmedos y plantaciones de café en las montañas, lomas y zomas kársticas. Pone 2 huevos blancos y se aparea de abril a junio.





Familia: Trochilidae

Nombre Científico: *Mellisuga minima*

Nombre Común: Zumbadorcito

Mide 6 cm (2.5"). Es un pequeño zumbador, color verde por encima y predominantemente blanco por debajo, con un pico negro y recto. Su quijada y garganta son a veces cubiertas de color. Sus laterales son color verde pálido. El macho adulto posee una cola dividida en dos. La hembra adulta posee una cola redondeada con puntas blancas. Su voz es alta, rítmica y metálica. Más oída que observada, es la segunda ave más pequeña del mundo. Habita en áreas abiertas con flores pequeñas, matorrales abiertos y cafetales. Pone 2 huevos blancos, se reproduce durante todo el año, principalmente de diciembre a mayo.





Familia: Apodidae

Nombre Científico: *Cypseloides niger*

Nombre Común: Vencejo

Mide 15-18 cm (5.75-7"). Es largo, negro, con cola en forma de tenedor. A corta distancia, son visibles sus cejas y frente blanca. Es mayormente silenciosa, pero ocasionalmente emite suaves notas como -tchip, tchip-, al volar. Es aéreo, frecuentemente vuela en bandadas. Habita en montañas, y es poco frecuente en tierras bajas y áreas costeras. Pone 1 huevo blanco y se reproduce de marzo a septiembre.





Familia: Caprimulgidae

Nombre Científico: *Caprimulgus carolinensis*

Nombre Común: Don Juan

Mide 31 cm (12"). Moteado de rojizo-marrón en todo su cuerpo, su pecho es principalmente negruzco con una banda blanca en la garganta. En la cola, el macho posee 3 plumas blancas en cada uno de los laterales. En la hembra, las plumas exteriores de la cola son entre crema y marrón oscuro. Su voz es un silbido claro, como un -chuck-wills-widow-. Es común en la Hispaniola. Es un ave completamente nocturna y es raramente avistada durante el día entre matorrales densos. Habita en áreas forestadas y ocasionalmente en la entrada de las cavernas, tanto en las costas como en medianas elevaciones.





Familia: Caprimulgidae

Nombre Científico: *Chordeiles gundlachii*

Nombre Común: Querebebe

Mide 20-25 cm (8-10"). Es como un halcón oscuro, con delgadas alas punteadas. Se distingue por una notoria mancha blanca en el ala y un vuelo errático. El macho muestra una estrecha banda blanca cerca de la punta de la cola. Su voz es una alta y distintiva alusión a su nombre -que-re-be-be-. Su período de reproducción es desde mayo hasta agosto. Es observado en grupos, persiguiendo insectos voladores en lo alto al amanecer o al atardecer. A veces se observa sentada en la carretera en las noches. Habita en áreas abiertas como campos, pastizales, sabanas y franjas costeras. Pone de 1 a 2 huevos de tinte azulado o verdoso y marcados de gris o marrón.





Familia: Ardeidae

Nombre Científico: *Ajaja ajaja*

Nombre Común: Cuchareta

Mide de 66-81 cm (26-32"). Es notable por su rosada coloración y su extraordinario pico en forma de cuchara o espátula. El juvenil es casi por completo blanco, con un poco de rosado. Son generalmente silenciosos y en períodos de gestación emiten suaves gruñidos. Anda en bandadas. Se alimenta escarbando en el agua, moviendo su cabeza de adelante hacia atrás, extrayendo organismos del sedimento. Se alimenta de pescados, invertebrados y materia vegetal. Habita principalmente en lagunas superficiales de agua salobre y a orillas de llanuras fangosas. Pone de 2 a 4 huevos blancos opacos con puntos oscuros. Se reproduce de agosto a septiembre.





Familia: Ardeidae

Nombre Científico: *Ardea herodias*

Nombre Común: Garza ceniza

Es mucho más grande que la garza real, mide de 107-132 cm (42-52"). Tiene dos diferentes fases: 1. Un aspecto grisáceo, con un pico recto con unas líneas sobre los ojos (cejas) negras. 2. Fase no muy común; plumaje totalmente blanco, con pico y patas amarillas canchales. Los pichones tiene la parte superior de la cabeza (la corona) marrón. Su canto es un sonido gutural como el canto de las ranas, repetido 3 o 4 veces. Es un ave solitaria y tímida. Habita tanto en lagunas y pantanos de agua dulce como de agua salada. Pone de 2-4 huevos azulados, hasta ahora se conocen como fechas de reproducción diciembre, y abril hasta agosto.





Familia: Ardeidae

Nombre Científico: *Bubulcus ibis*

Nombre Común: Garza ganadera

Garza chiquita, mide de 48-64 cm (22-25"). Conocida por su pico corto y grueso de coloración amarilla. Cuando están anidando tienen las patas, los ojos y el pico de coloración rojiza, así como un tono bronceado en la corona, el pecho y la parte superior de la espalda. Su sonido es gutural cuando están cerca de sus colonias de apareamiento. Habita en pastizales y en campos donde hay tractores arando. Anidan en manglares y otras arboledas. Ponen de dos a cuatro huevos blanco-azulados y se aparean principalmente de abril a julio.





Familia: Ardeidae

Nombre Científico: *Butorides striatus*

Nombre Común: Cra-cra, cuaco, martinete

Mide de 40-48 cm (16-19"). Tiene el plumaje oscuro, el cuello corto, y las patas de color verde amarillento tirando a anaranjado. Cuando no se siente observada emite una serie de sonidos parecidos a -kek,kak-. Habita en lagunas. Pone 3 huevos azul-verdosos y como las demás garzas, se aparea de abril a junio.





Familia: Ardeidae

Nombre Científico: *Botaurus lentiginosus*

Nombre Común: Guanabana Rojo, Ave Toro

Mide de 58 a 61 cm (23-24"). Su marca negra en el cuello y el hábito de señalar con su pico hacia arriba son sus características principales. Al volar se distingue una coloración negruzca en la punta de sus alas. Posee un sonido peculiar, -oong-ka-chunk!-. Usualmente no es detectado, hasta que se sonroja. Habita en lugares cenagosos y pantanos de agua fresca con vegetación emergente.





Familia: Ardeidae

Nombre Científico: *Egretta caerulea*

Nombre Común: Garza pinta (azul)

Mide 56-71 cm (22-23"). Pico grisáceo con punta negra. Conocido por su tamaño mediano y su plumaje uniforme, gris oscuro. Los pichones son completamente blancos por un año. Su sonido es parecido al de las demás garzas, aunque suena como un -gruhh-. Habita en aguas calmadas tanto dulces como saladas, y en manantiales. Pone de 2-4 huevos azules y se aparea de abril a julio.





Familia: Ardeidae

Nombre Científico: *Egretta thula*

Nombre Común: Garza de rizos

Mide de 51-71 cm (20-28"). Su pico es totalmente negro, las patas negras y los pies amarillos. Los pichones son muy parecidos a la garza pinta, pero estos tienen la parte de atrás de las patas, amarillas. Su sonido -guarr- es más áspero que el de la garza blanca. Habita principalmente en pantanos de agua fresca, pero también en bancos de ríos y lagunas saladas. Pone de 2-5 huevos azul verdosos. Se reproduce de abril a junio y en octubre.





Familia: Ardeidae

Nombre Científico: *Egretta tricolor*

Nombre Común: Garza Pechiblanco

Más larga que la garza azul/pinta, 61-71 cm (24-28") y muy parecida en coloración. Al igual que la garza azul tiene su plumaje de color grisáceo oscuro, pero esta tiene el vientre blanco. El pico es amarillo pálido. Su canto es muy similar al de la garza de rizos. Habita en manglares pantanosos y en lagunas saladas, aunque no es muy frecuente, suele encontrarse en aguas frescas de lugares secos. Pone de 3-4 huevos azulados, apareándose de abril a julio.





Familia: Ardeidae

Nombre Científico: *Ixobrychus exilis*

Nombre Común: Martinetico

Mide de 28 a 35 cm (11-14"). Se distingue por su pequeño tamaño y su coloración amarillo-rojiza. La macha crema en su ala superior es una muy visible marca de campo. El macho adulto posee la corona y espalda negras, mientras que la hembra las tiene marrones. El juvenil posee la corona y espalda marron pálida y el pecho profusamente rayado. Su voz suena como -koo-koo-koo-koo-. Es una ave solitaria. Si no fuese porque se sonroja podría pasar desapercibida entre la vegetación. Habita en pantanos de aguas frescas, y canales de manglares. Pone de 2 a 5 huevos blanco-azulados. Se reproduce desde mayo hasta agosto.



Familia: Ardeidae

Nombre Científico: *Nycticorax nycticorax*

Nombre Común: Rey Congo

Mide de 58-71 cm (23-28"). Es una garza de mediano tamaño. El adulto es identificado por su corona y espalda negras; su cara, partes inferiores y plumas de la cabeza son blancas. El juvenil es marrón abigarrado de blanco. Al volar sólo las patas se extienden mas allá de la cola. Su voz es un distintivo -cuark-. Es nocturna, usualmente vista cuando amanece y en el ocaso. Solitaria, excepto en la colonia de reproducción, habita en pantanos de aguas frescas, lagunas salobres y pantanos salados. Pone de 2 a 5 huevos de un pálido azul verdoso. El período reproductivo varía entre enero y julio.





Familia: Ciconidae

Nombre Científico: *Mycteria americana*

Nombre Común: Faisán, Coco

Mide 100 cm (40"). Se caracteriza por su gran tamaño, largas patas, coloración blanca con negro en las alas, cabeza oscura y pico largo, curvo en la punta. El adulto tiene la cabeza calva y negruzca con un pico negro. El juvenil tiene las plumas de la cabeza marrones y el pico amarillo. Al volar se distingue por la orilla amarilla de sus alas y las patas extendidas hacia atrás más allá de la cola. Su sonido es un gruñido sofocado bastante ruidoso. Habita en lagunas, manglares, costas y llanuras fangosas, así como en arrozales, ciénagas y cuerpos de agua del interior. Pone de 3 a 5 huevos blancos más grandes que los huevos de gallina. Se reproduce de noviembre a febrero.





Familia: Threskiornithidae

Nombre Científico: *Eudocimus albus*

Nombre Común: Coco Blanco

Mide de 56-71 cm (22-28"). Esta blanca y larga ave se distingue por su pico largo, curvo y rojizo en el adulto. Al volar estira su cuello y se pueden notar las manchas negras en las puntas de sus alas. El juvenil es principalmente marrón con la barriga y la rabadilla blanca. Su voz es una serie de bajos gruñidos nasales que suenan -oohh oohh-. Viaja típicamente en bandadas. Habita en pantanos de agua fresca, arrozales y lagunas salobres. Pone 3 huevos entre verde y blanco o verde-amarillentos con marcas marrones. Su período de gestación es de abril a septiembre.





Familia: Threskiornithidae

Nombre Científico: *Plegadis falcinellus*

Nombre Común: Coco Prieto

Mide 56-64 cm (22-25"). El adulto se caracteriza por ser de coloración oscura y por poseer un pico curvado hacia abajo. El juvenil es más claro que el adulto. Su voz es un gruñido repetitivo seguido de otro sonido peculiar que recuerda el de un rebaño de ovejas. Anda típicamente en bandadas y aparentemente vaga entre islas que poseen hábitats en buenas condiciones. Habita en llanuras fangosas, arrozales y en sabanas pantanosas. Pone de 2 a 4 huevos de azul verdoso-oscuro o a veces azul-grisáceo. Su período de reproducción es principalmente de junio a agosto.





Familia: Columbidae

Nombre Científico: *Columba inornata*

Nombre Común: Paloma ceniza

Mide de 38-40 cm (15-16"). Posee un plumaje pálido con muchas tonalidades marrones, alas con bordes blancos, partes superiores color rojizo, y abdomen rojizo. Su sonido es un profundo y deliberado - whoo, wo-oo- o -who, oo-oo- y otras variaciones. Es común en las Antillas Mayores y nativa de la República Dominicana. Es un ave arbórea, típica de bandadas. Habita en sabanas, áreas maderables abiertas, bosque costero sobre rocas, piedras calizas, y bosques en zonas bajas.





Familia: Columbidae

Nombre Científico: *Columba leucocephala*

Nombre Común: Paloma coronita

Es una paloma pequeña. Mide de 33-36 cm (13-14"). Su plumaje luce totalmente gris excepto por la corona blanca. La hembra tiene la corona color blanco-grisáceo. Emite un sonido como -juu, tuc, tuuuu-. Es altamente gregaria. En época de apareamiento habita en bosques costeros y manglares, pero puede habitar tierra adentro, en las montañas si encuentran buenas áreas de alimentación, fuera de la época de reproducción. Pone 2 huevos de un blanco brillante. Se aparea de marzo hasta agosto, pero las épocas de anidamiento cambian de acuerdo al área y dependen de las condiciones de alimentación en el área.





Familia: Columbidae

Nombre Científico: *Columba squamosa*

Nombre Común: Paloma Turca

Mide de 36-40 cm (14-16"). Cuando es adulta en la distancia se ve gris. Más de cerca la cabeza, cuello y pecho tienen un tinte rojizo-purpura. Cuando es joven, es más rojizo-marrón que el adulto. Su voz es un distintivo llamado común que se escucha frecuentemente temprano en las mañanas, como un enfático -cruu, cruu-cru-cruu- con un marcado acento en la cuarta sílaba. La primera sílaba se separa de las demás por una pausa. Es mayormente observada sobrevolando los pabellones de los bosques. Habita en bosques montañosos. Pone 2 lustrosos huevos blancos. Se aparea durante todo el año, pero principalmente de marzo a junio.





Familia: Columbidae

Nombre Científico: *Columbina passerina*

Nombre Común: Rolita

Mide de 15-18 cm (5.75-7"). La única paloma pequeña de las Antillas, de moderada variación de plumaje entre las islas. El macho posee una corona y nuca gris-azulada con tintes rosados en las partes inferiores. La hembra es más uniformemente gris en todo el cuerpo. Durante el vuelo, brilla una mancha marrón-rojiza sobre su ala. Su voz es un llamado monótono, repetido tanto solo como en notas dobles, -cuu, cuu-cuu o cu-cuu, cuu-. Es un ave principalmente terrestre, pero a veces busca refugio en los árboles. Pone 2 huevos blancos brillantes. Se reproduce durante todo el año, con mayor incidencia en los meses de mayo y junio.





Familia: Columbidae

Nombre Científico: *Geotrygon chrysis*

Nombre Común: Perdíz grande

Mide de 28-30 cm (11-12"). Observe la línea blanca bajo el ojo, la espalda color marrón-rojizo y las alas con las plumas inferiores color blanco. La hembra es menos iridiscente en el cuello y la espalda. Su voz es como un quejido agudo que va aumentando gradualmente de volumen y después se apaga rápidamente. Habita en bosques densos y matorrales en zonas costeras sobre rocas. Le agradan las zonas áridas y semi-áridas, pero también los bosques de montaña poco frecuentados por los seres humanos. Anida entre arbustos bajos, bromelias o en el suelo. Pone solo 2 huevos y se aparea de febrero hasta agosto.





Familia: Columbidae

Nombre Científico: *Geotrygon montana*

Nombre Común: Perdíz colorada

Mide 25 cm (10"). El macho es predominantemente rojizo, con una raya clara visible debajo del ojo. La hembra es más marrón, y con una raya facial menos visible que la del varón. Su sonido es un -cuu- que se va apagando gradualmente en fuerza, como soplar a través de la boca de una botella. Habita principalmente en bosques densos y plantaciones de café en las lomas y montañas, pero también puede ser localizada en las costas. Esta ave es más fácilmente escuchada que vista. Pone 2 huevos de color claro y se aparea desde febrero hasta agosto.





Familia: Columbidae

Nombre Científico: *Zenaida aurita*

Nombre Común: Rolón

Mide de 25-28cm (10-11"). Su plumaje es muy parecido al de la tórtola, pero se distingue por tener los bordes blancos en las alas secundarias y la cola redondeada con las puntas de las plumas blancas. Su vientre es de un color marrón-rojizo. Su voz es como un gentil -cuu-uu, cuu, cuu-. Habita en áreas costeras abiertas, jardines y áreas hoteleras. También en áreas de bosques y pinares, pero no es frecuente en la parte alta de las montañas, pues prefiere las zonas bajas.





Familia: Columbidae

Nombre Científico: *Zenaida asiática*

Nombre Común: Aliblanca

Mide de 28-30 cm (11-12"). Se distingue con facilidad, gracias a su largo patrón blanco en las alas. Esta coloración es muy notable tanto cuando está posada como volando. La punta de las plumas de la cola también son blancas. Usualmente anda en bandadas, principalmente en zonas bien forestadas. Su voz es una especie de ininterrumpido -cuu-cu cu-cuu, cu-cu-cuu-. Habita en bosques costeros sobre rocas, manglares, humedales forestados, bosques y jardines urbanos. Se reproduce en colonias, construyendo frágiles nidos a mediana altura. Pone 2 huevos blancos y se aparea de abril a junio.





Familia: Columbidae

Nombre Científico: *Zenaida macroura*

Nombre Común: Tórtola

Mide de 28-33 cm (11-13"). Plumaje marroncito oscuro en las alas, claro en el abdomen; las crías tienen muchas pintitas negras. La tórtola tiene la cola larga y afilada. Su canto es como un quejido largo -cuu-uu, cuu, cuu, cuu-, la segunda sílaba es notoriamente aguda. Se alimenta en el suelo y viaja usualmente en bandadas excepto cuando los adultos se aparean para reproducirse. Habita en tierras bajas y abiertas, bosques secos costeros, y zonas de producción agrícola, casi siempre cerca de cuerpos de agua fresca. Pone 2 huevos blancos y se reproduce de marzo a agosto.





Familia: Alcedinidae

Nombre Científico: *Ceryle alcyon*

Nombre Común: Martín Pescador

Mide de 28-36 cm (11-14") Se caracteriza por su pico grande y largo, su cresta azul-grisacea, y su hábito de sumergirse en el agua para capturar los peces que son su fuente de alimentación. El macho se distingue por tener una banda azul en el pecho; la hembra tiene una banda azul y una anaranjada. Su voz es una especie de zumbido muy alto. Habita en cuerpos de agua tranquilas, tanto salinas como frescas.





Familia: Todidae

Nombre Científico: *Todus angustirostris*

Nombre Común: Barrancolí, Chi-cuí

Un poco más chiquito que el barrancolí *Todus subulatus*, 11cm (4.25") con plumaje muy parecido. Se diferencia en que es más redondito, con el plumaje inferior sin tonalidad grisácea y no tiene la mandíbula tan roja. El sonido es muy diferente se oye como, -chip-chee, chippy, chippy, chippy, chip-. Es endémico de la Hispaniola y es muy común en bosques húmedos de montaña. Es considerado amenazado en Haití debido a la destrucción de su hábitat. Generalmente habita en bosques húmedos y densos, incluyendo pinares pero puede ser encontrado localmente en elevaciones más bajas, como Los Haitises. Pone de 3-4 huevos blancos y se aparea de abril a junio.





Familia: Todidae

Nombre Científico: *Todus subulatus*

Nombre Común: Barranquí, Barranquero

Mide de 28-36 cm (11-14") Se caracteriza por su pico grande y largo, su cresta azul-grisacea, y su hábito de sumergirse en el agua para capturar los peces que son su fuente de alimentación. El macho se distingue por tener una banda azul en el pecho; la hembra tiene una banda azul y una anaranjada. Su voz es una especie de zumbido muy alto. Habita en cuerpos de agua tranquilas, tanto salinas como frescas.





Familia: Crotophaginae

Nombre Científico: *Crotophaga ani*

Nombre Común: Judío

Ave de gran tamaño. Mide de 30-33 cm (12-13"). Plumaje totalmente negro con un pico grueso y áspero, parecido al de una cotorra. Su cola larga y plana la hacen fácil de distinguir en la distancia. Su sonido es una especie de silbido fuerte y agudo. Anda en pequeñas y ruidosas bandadas, y habita en tierras bajas y abiertas, con árboles o arbustos dispersos. Es una de las pocas aves en el mundo que construye grandes nidos que son utilizados por varias hembras a la vez. Es por esto, se pueden encontrar hasta 20 huevos color azul cielo, en un solo nido, separados por capas de hojas en grupos de 4-5. aparentemente se reproducen durante todo el año.





Familia: Cuculidae

Nombre Científico: *Coccyzus americanus*

Nombre Común: Primavera

Mide 28 - 32 cm (11 - 12.5"). Se caracteriza por ser blanco en su parte inferior y la ausencia de negro en las mejillas. Tiene una cola larga y blanca. Su pico es curvo hacia abajo y amarillo en la base. Al volar se distingue una mancha marrón-rojiza en las alas. Su canto es un sonido gutural que suena como -ka ka ka ka ka ka ka kao kao kao kao-. El volumen va incrementando desde el inicio, hasta llegar un momento en el que se mantiene constante. Habita en tierras bajas, bosques costeros sobre rocas y bosques secos. Pone de 2 - 5 huevos azules y su período reproductivo es de abril a julio.





Familia: Cuculidae

Nombre Científico: *Saurothera longirostris*

Nombre Común: Pájaro bobo

Mide de 41-46 cm (16-18"). Su gran tamaño, su pecho color gris pálido, su larga cola con mechas blancas y derechas y su pico delgado y alargado conforman sus características principales. Posee una mancha marrón-rojiza en sus alas, y la coloración de su cuello varía del blanco a un naranja pálido. Su canto es un prolongado -ka-ka-ka-ka-ka-ka-kau-kau-ko-ko- en tonos descendentes. Se encuentra bien distribuido en áreas forestadas, incluyendo plantaciones de café. Pone dos huevos blancos, y se aparea de marzo a junio.





Familia: Cuculidae

Nombre Científico: *Coccyzus minor nesiotes*

Nombre Común: Pájaro bobo

Mide de 28- 30 cm (11-12"). Se observa una mancha negra en su oído y su abdomen es color crema. El pájaro bobo es largo y delgado con la cola cubierta de mechadas blancas y derechas, tiene el pico curvo, amarillo en su base y no posee la mancha marrón-rojiza en sus alas. Su canto es similar al canto del Primavera pero más lento y nasal. Es un ave arbórea y no muy activa. Habita en bosques secos sobre rocas, también en manglares, en las sombras de cafetales, y demás áreas de bosques no montañosos. Pone de 2-3 huevos, y se reproduce de febrero a junio.





Familia: Charadriidae

Nombre Científico: *Charadrius alexandrinus*

Nombre Común: Corredor, playero

Mide de 14-15 cm (5.5-5.75"). Se distingue por su pequeño tamaño, su pálida coloración, su pico negro delgado, sus marcas negras en el cuello y sus patas oscuras. Cuando se encuentra en edad reproductiva presenta una mancha negra en su oído. El juvenil carece de las marcas negras del plumaje. Su voz es un debil silbido similar al pito humano utilizado para llamar la atención. Habita principalmente en playas y en las llanuras a orillas de lagunas salobres. Pone 3 huevos color arena con marcas parecidas a garabatos. Se reproduce de enero hasta agosto, y se encuentra en peligro de extinción debido a la destrucción de su hábitat.





Familia: Charadriidae

Nombre Científico: *Charadrius melodus*

Nombre Común: Playerito

Mide 18 cm (7"). Se distingue por poseer su parte superior de color gris pálido, pico pequeño y patas anaranjadas. El juvenil presenta la banda del pecho parcial o ausente. El adulto presenta la base del pico anaranjada y la banda del pecho puede estar parcial o completa. En su vuelo se nota la cubierta superior de la cola blanca y una mancha negra cerca de la punta de la cola. Su voz es un fino silbido que suena como -piip y pii-lo-. Habita en áreas dragadas abandonadas y en orillas arenosas, de aguas tanto frescas como salinas. También en cayos alejados de la playa.





Familia: Charadriidae

Nombre Científico: *Charadrius semipalmatus*

Nombre Común: Playero

Mide 18.5 cm (7.25"). Es identificada por tener la parte superior marrón, una banda oscura en el pecho, pico corto y gordito y patas anaranjadas. A veces la banda del pecho esta incompleta y simplemente presenta rayas en cada lado del pecho. Cuando no está en época de reproducción su pico es oscuro y puede carecer de las bases anaranjadas. Cuando está en edad reproductiva la base del pico es naranja. Su voz es una especie de quejido como -wiit-. también emite un sonido parecido a -tii-wiit-. Se encuentra típicamente en bandadas, frecuentemente con otras aves en llanuras costeras.





Familia: Charadriidae

Nombre Científico: *Charadrius vociferus*

Nombre Común: Tito, fraile

Mide 25cm (9.75"). Fácilmente identificado por poseer dos bandas negras en el pecho. En su vuelo su rabadilla marrón-rojiza es sumamente notoria. Su voz es un quejido alto como -kii y dii-di-. Habita en campos húmedos, de pocas hierbas, en hoyos fangosos y en las orillas de lagunas de aguas frescas. Pone de 3 a 4 huevos de color crema pálido, reproduciéndose de marzo a octubre.





Familia: Charadriidae

Nombre Científico: *Charadrius wilsonia*

Nombre Común: Cabezón, corredor

Mide de 18-20 cm (7-8"). La ancha y larga banda del pecho y su pico negro son buenas marcas de campo. El macho presenta la banda del pecho negro, la hembra y el juvenil presentan la banda color marrón. Su sonido es un enfático silbido estridente que suena como -piti,whit o whiit-. También un sonido rápido de 2 a 3 silabas como -ki-ki-ki-. Habita principalmente en las márgenes de lagunas saladas. Pone de 2 a 4 huevos de color crema claro con manchas dispersas. Se reproduce en los meses de marzo a julio.





Familia: Charadriidae

Nombre Científico: *Pluvialis squatarola*

Nombre Común: Playero

Mide de 26-34 cm (10-13.5"). Es un ave relativamente grande y gruesa, con el pico corto y una coloración que varía dependiendo de su época de apareamiento. Cuando no es época de apareamiento, su plumaje es moteado de coloración gris clara, con poco contraste entre su corona gris y sus cejas blancuzcas. En época de apareamiento, presenta el abdomen negro y la parte superior de la cabeza, blanca. Su voz es un quejido de una sola nota que suena como -cli o también cli-li-. Vive en bandadas y habita en llanuras costeras preferiblemente fangosas.





Familia: Jacanidae

Nombre Científico: *Jacana spinosa*

Nombre Común: Gallito de Agua

Mide 19-23 cm (7.5-9"). Posee largas alas con manchas amarillas y patas extremadamente largas, delgadas y verdosas. El adulto presenta una coloración oscura marrón-rojiza, con su cabeza y cuello negruzcos. Su pico y su frente son amarillos. Vuelan bajo, sobre la superficie del agua, casi sumergiendo sus patas y la punta de sus alas. Su sonido es un cacareo repetitivo muy activo y ruidoso. Solo el macho puede incubar los huevos. Hábita en cuerpos de agua fresca con vegetación de hojas flotantes. Pone de 3 a 4 huevos de coloración crema-marron, y se reproduce de abril a septiembre.





Familia: Laridae

Nombre Científico: *Larus argentatus*

Nombre Común: Gaviota del Norte

Mide 56-66 cm (22-26). Es una gaviota larga que a su vez, posee un pico largo. No alcanzan su plumaje adulto hasta pasados los 4 años, y hasta entonces, su coloración varía enormemente. Hacia su tercer año, en su cola blanca se observa una banda negra y su pico es amarillento con una banda oscura. El adulto presenta un pico bien amarillo con una raya roja cerca de la punta de la mandíbula inferior. Su cabeza y partes inferiores son blancas, con la cabeza manchada de un marrón pálido. Cuando se encuentra en período reproductivo tanto su cabeza como su parte inferior son blancas. Habita en áreas costeras, lagunas y puertos.





Familia: Laridae

Nombre Científico: *Larus atricilla*

Nombre Común: Gaviota cabecinegra

Mide 38-43 cm (15-17"). El adulto en período reproductivo se distingue por poseer tanto la cabeza como su covertedor gris oscuro, las puntas de las alas negras y el pico rojizo. Fuera del período reproductivo, posee una marca gris difusa en la parte trasera de su blanca cabeza y su pico es negro. El joven es de tonalidad manchada de un marrón-grisáceo con la barriga blanca. Su voz es un graznido de alguna manera variable como -caw y caw-aw-. Esta es la gaviota más común de las antillas. Habita en bahías calmadas, aguas costeras e islotes lejos de la costa. Pone de 3 a 4 huevos marrón-grisáceo con rayas largas. Se aparea de abril a julio.





Familia: Laridae

Nombre Científico: *Larus delawarensis*

Nombre Común: Gaviota

Mide 46-51 cm (18-20"). El adulto que no se encuentra en período reproductivo posee un pico amarillento con una raya negra y sus patas verde amarillentas. Su cubierta es gris, la punta de sus alas de color negro rayadas de blanco y su cabeza y partes superiores son blancas, con manchas de un marrón pálido. Cuando se encuentra en período reproductivo su cabeza y partes superiores no están manchadas. Habita en áreas costeras, puertos, lagunas y áreas abiertas, tanto estacionamientos, como pastizales. Es frecuente visitante en áreas urbanas, pero raramente observado lejos en el mar.





Familia: Laridae

Nombre Científico: *Sterna antillarum*

Nombre Común: Gaviota

Mide 21-24 cm (8.5-9.5"). Es la gaviota más pequeña de las Antillas. El adulto posee una corona negra, la frente blanca con un patrón en forma de V en la cabeza, su pico es color marrón y sus patas son amarillas. Durante su período de reproducción, el pico es amarillo claro con la punta negra y el patrón en V de su cabeza es de un negro más intenso. Habita en áreas costeras, puertos y lagunas. Pone de 1 a 2 huevos, raramente 3, de coloración blanco-cremoso con rayas color marrón chocolate. Se reproduce de abril a julio.





Familia: Laridae

Nombre Científico: *Sterna anaethetus*

Nombre Común: Gaviota monja

Mide 38 cm (15"). El adulto es de coloración grisacea-marrón por encima y blanco por debajo, con la nuca blanca y una línea blanca encima y debajo del ojo. El juvenil es similar al adulto, pero su parte superior está cubierta de un gris pálido. Su voz es como -yip o yirk-. También un continuo -ah-ah-ah-. Habita lejos de la costa. Pone 1 huevo de coloración crema-gris pálido y marcado con numerosas líneas finas de marrón oscuro. Se reproduce de abril a julio.





Familia: Laridae

Nombre Científico: *Sterna dougallii*

Nombre Común: Palometa

Mide 35-41 cm (14-16"). Se distingue por su larga cola en forma de tenedor, plumaje y alas primarias de color gris pálido, cola extendida más allá de la punta de las alas cuando descansa y en la parte inferior de sus plumas primarias, tiene poca o ninguna coloración negra. Su pico es negro y posee una marca oscura sobre su hombro que atraviesa su frente blanca y pasa sobre los ojos. El adulto que se encuentra en período reproductivo posee un pico negro con algo de rojo y corona negra. Su voz es como -krik- y dos sílabas suaves -tu-ick-. Habita en áreas costeras, puertos y lagunas. Pone de 1 a 3 huevos, de coloración gris-verdoso a crema, rayados de púrpura-marrón. Se aparea de mayo a junio.





Familia: Laridae

Nombre Científico: *Sterna hirundo*

Nombre Común: Gaviota común

Mide 33-40 cm (13-16"). El adulto, cuando se encuentra en período reproductivo se distingue por las marcas negras en el tope de su cabeza, pico rojo con la punta negra, así como la parte afuera de las alas primarias. El color negro se puede observar durante el vuelo. La cola no se extiende mas allá de las puntas de las alas cuando descansa. En período no reproductivo posee el pico negro, el hombro con distintivas rayas oscuras y la frente blanca. Su voz es un fuerte -kii-arr-r-, particularmente utilizado en defensa de su nido. Habita en áreas costeras, lagunas y puertos. Pone de 2 a 3 huevos crema pálido con rayas marrones. Se reproduce de mayo a julio.





Familia: Laridae

Nombre Científico: *Sterna forsteri*

Nombre Común: Gaviota

Mide 35-42 cm (14-16.5"). En el adulto que no se encuentra en período reproductivo, se notan sus alas primarias blanco-plateadas, una larga línea negra rodeando su ojo, y cola en forma de tenedor, extendiéndose mas alla de sus alas, al descansar. Cuando se encuentra en período reproductivo, presenta un pico anaranjado con la punta negra. El juvenil es muy similar al adulto en período no reproductivo, pero posee una cola más corta y algo de negro en sus alas primarias. Habita en áreas costeras, puertos y lagunas.





Familia: Laridae

Nombre Científico: *Sterna fuscata*

Nombre Común: Gaviota oscura

Mide 38-43 cm (15-17"). El adulto es negruzco por encima y blanco por debajo con una cola en forma de tenedor. Las plumas exteriores de su cola son blancas y las de la frente son blancas extendiéndose solo hasta el ojo. El juvenil presenta una coloración marrón oscura en todo su cuerpo con rayas blancuzcas en la cubierta de las alas. La forma de tenedor de su cola es menos notoria que en el adulto. Su voz es un llamado distintivo -waid-ei-weiki- o -weicky-weick-. Muy aéreo, no se zambulle y es una de las más abundantes aves acuáticas tropicales del mundo. Habita lejos de la costa. Pone 1 huevo de color crema con rayas marrón oscura. Se reproduce de abril hasta agosto.





Familia: Laridae

Nombre Científico: *Sterna maxima*

Nombre Común: Gaviota real

Mide 46-53 cm (18-21"). Es una gaviota larga con un pico anaranjado-amarillo. En el tope y en la parte trasera de la cabeza posee plumas negras alargadas formando una cresta abundante. El adulto en período reproductivo tiene la corona completamente negra. Cuando no está en período reproductivo y/o es joven, su frente es blanca. Su voz es un silbido alto como -kri-i-ik-, muy similar a un periquito. Habitan en áreas costeras, puertos y lagunas. Pone de 1 a 2 huevos blancos a crema pálido con rayas marrones. Se reproduce de abril a julio y es irregular en la ocasión y número de parejas.





Familia: Laridae

Nombre Científico: *Sterna sandvicensis*

Nombre Común: Gaviota pico agudo

Mide 41-46 cm (16-18"). Es una gaviota relativamente larga. El adulto en período reproductivo tiene una coloración gris pálida, observándose casi blanca en la distancia. Posee abundante plumaje negro en la cresta y un pico negro largo y delgado, con una punta amarilla muy notoria. Su cola no se extiende mas allá de las alas, cuando descansa. Cuando no se encuentra en período reproductivo, su frente es blanca. El tope de su corona es frecuentemente blanco bordeado de negro. Habita en áreas costeras, puertos y lagunas. Pone de 1 a 2 huevos crema blancos, con rayas finas de un marrón oscuro. Se reproduce de mayo a julio.





Familia: Recurvirostridae

Nombre Científico: *Himantopus mexicanus*

Nombre Común: Zancudo

Mide 34-39 cm (13.5-15.5"). Se puede notar su largo tamaño, largas patas rosadas, parte superior negra y partes inferiores blancas. En su vuelo, se pueden notar las alas negras tanto abajo como arriba que extienden en forma de V, así como su parte inferior blanca y su cola y espalda bajas. Su sonido es una alta y ronca serie de notas como -wit, wit, wit, wit, wit-. Típicamente anda en bandadas. Habitan en llanuras fangosas, ciénagas saladas y pantanos de manglares abiertos. Pone de 3 a 7 huevos de coloración verde olivo. Se reproduce tarde en abril hasta agosto y ocasionalmente en septiembre y octubre.





Familia: Scolopacidae

Nombre Científico: *Actitis macularia*

Nombre Común: Playerito Manchado

Mide 18-20 cm (7-8"). El juvenil presenta sus partes inferiores blancas con marcas oscuras a los lados del cuello y la base del pico anaranjada. El adulto presenta distintivas manchas oscuras en su parte inferior y el pico naranja con la punta negra. Su vuelo es muy superficial, con rápidos aleteos y muestra una raya blanca en sus alas. Se distingue por su andar jorobado. Su voz es un silbido como -wi-wiit-. Es un ave solitaria. Habitan en las orillas de los manglares y líneas costeras, arroyos y arrozales.





Familia: Scolopacidae

Nombre Científico: *Arenaria interpres*

Nombre Común: Playero turco

Mide de 21-23 cm (8-9"). Cuando no está en período de apareamiento, presenta marcas oscuras en su pecho y patas amarillas. En período de apareamiento presenta marcas inusuales blancas y negras en su cara y la parte trasera roja-anaranjada. Su canto posee una variedad de llamados incluyendo un sonido alto y nasal -cuck-cuck-cuck-, aumentando en volumen. Habita tanto en costas arenosas como costas rocosas.





Familia: Scolopacidae

Nombre Científico: *Calidris alba*

Nombre Común: Playerito Blanco

Mide 18-22 cm (7-8.5"). El juvenil posee el color más claro entre los Playeros, con su parte inferior blanca y un gris claro en su parte superior. Frecuentemente, posee una marca negra en la curva de su ala. El adulto posee cabeza y pecho marrón-rojizo. Cuando vuela, sobresale la raya blanca de su ala. Su voz es un distintivo -wit-. Habita principalmente en playas arenosas, donde las bandadas avanzan según el vaiven de las olas.





Familia: Scolopacidae

Nombre Científico: *Calidris fuscicollis*

Nombre Común: Playerito

Mide 18-20 cm (7-8"). Su rabadilla blanca lo distingue de otros playeritos durante el vuelo. Fuera del período reproductivo presenta una coloración marrón-grisacea arriba y en la parte superior del pecho, aparentemente oculto. Al entrar en período reproductivo es más marrón con manchas rojizo-marrón en su corona, en la parte más alta de su espalda y en la mancha de su oído. Su sonido es un chillido distintivo como un -piit- o -yiit- alto y fino. Este playerito se puede observar regularmente en llanos costeros junto a otras aves playeras. Habita en arrozales, llanuras cenagosas y a orillas de las aguas.





Familia: Scolopacidae

Nombre Científico: *Calidris himantopus*

Nombre Común: Playero zancudo

Mide 20-22 cm (8-8.5"). Es una especie difícil de identificar. Sus mejores marcas de campo son sus deslustradas patas verdosas, la mancha blancuzca de su ceja y su pico largo, grueso en la base e inclinado en su punta. Fuera de su período reproductivo presenta una coloración grisacea arriba y blancuzca debajo, notandose más la mancha pálida de su ceja. Cuando se encuentra en período reproductivo se observa una mancha marrón-rojiza en su oído y su parte inferior muy manchada. Su sonido es un -kiui- muy suave, no musical. Se encuentra típicamente en bandadas. Habita en llanuras cenagosas y lagunas superficiales.





Familia: Scolopacidae

Nombre Científico: *Calidris mauri*

Nombre Común: Playerito

Mide 15-18 cm (5.75-7"). Posee un pico relativamente largo, pesado en su base, estrecho e inclinado en su punta. En período de reproducción, se aprecia una coloración marrón-rojiza en su corona, en el parche de su oído y en su omóplato. Fuera de su período reproductivo, su parte superior es de coloración marrón grisácea y blancuzca en su parte inferior. Su sonido durante el vuelo es como un -kriip- grosero y quejoso. Esta ave generalmente se alimenta en aguas profundas. Habita a orillas de aguas, particularmente en llanuras cenagosas.





Familia: Scolopacidae

Nombre Científico: *Calidris melanotos*

Nombre Común: Playerito

Mide 20-24 cm (8-9.5"). Se caracteriza por su tamaño mediano, patas y pico verde-amarillentos y acentuada demarcación entre su pecho manchado y su vientre blanco. Los machos son frecuentemente más largos que las hembras. Antes de iniciar su período de reproducción presentan una coloración gris-marrón en su parte superior, en su cabeza y en su pecho. El macho en período reproductivo tiene el pecho manchado de negro. Posee una mancha fina en sus alas y su rabadilla está dividida por una raya negra. Su voz es un bajo y picado -krip-. Es típicamente observado en bandadas pero no en asociación con otros playeritos. Habita en praderas y áreas de pasto.





Familia: Scolopacidae

Nombre Científico: *Calidris minutilla*

Nombre Común: Playerito

Mide 12.5-16.5 cm (5-6.5"). En esta especie se puede notar su pequeño tamaño y su patas verde-amarillentas. Su coloración es marrón, su pecho es manchado y su pico es fino con una punta inclinada. Cuando no se encuentra en período reproductivo su coloración es marrón arriba y en su pecho; con su barriga y abdomen blancos. En su período reproductivo su plumaje es más manchado y posee pequeñas manchas marrón-rojizo. Su voz es un silbido fino como un -wi-wi-wit-. Anda típicamente en bandadas, acompañado del playerito *Calidris pusilla*. Habita a orillas de las aguas, particularmente en llanuras cenagosas.





Familia: Scolopacidae

Nombre Científico: *Calidris pusilla*

Nombre Común: Playerito

Mide 14-16.5 cm (5.5-6.5"). Este el Playero más común y con el cual todos los otros deben ser comparados. Se identifica por su pequeño tamaño y su pico negro y mediano. El juvenil es gris-marrón por encima y blancuzco por debajo. El adulto es finamente rayado en la parte superior del pecho y de tinte rojo-marrón en la parte superior de su cuerpo. La hembra tiene el pico más largo e inclinado en la punta que el macho. En su vuelo se puede notar la raya blanca de su ala y su rabadilla blanca dividida por una raya negra. Su voz es un suave -chirk-. Viaja en grandes bandadas. Habita en llanos fangosos, orillas de aguas cenagosas y lagunas saladas.





Familia: Scolopacidae

Nombre Científico: *Catoptrophorus semipalmatus*

Nombre Común: Chorlo

Mide 38-40 cm (15-16"). Se distingue por su gran tamaño, coloración gris clara, patas grises y pico fino. El adulto posee unas rayas finas y negras en su cabeza, cuello y pecho. El juvenil es más uniformemente gris. En su vuelo se nota el patrón blanco y negro de sus alas. Su voz es un -chip-chip-chip-. Habita en llanuras costeras, pero visita las orillas de aguas saladas y frescas. Pone 4 huevos color crema con manchas bien marcadas. Se reproduce de abril a junio.





Familia: Scolopacidae

Nombre Científico: *gallinago gallinago*

Nombre Común: Guineito

Mide 27-29 cm (10.5-11.5"). Su pico largo y cabeza y espalda manchadas son buenas marcas de campo. Su cola es marrón-rojiza y vuela en zig-zag. Su sonido es gutural y de alguna manera variable cuando se sonroja. Habita a orillas de aguas frescas cubiertas de hierba, sabanas y pastizales.





Familia: Scolopacidae

Nombre Científico: *Limnodromus griseus*

Nombre Común: Playero pico largo

Mide 26-30 cm (10-12"). Su pico largo y recto es muy distintivo. Cuando no se encuentra en período reproductivo es de coloración verde arriba y blancuzca debajo con un gris pálido en el pecho y una mancha blanca en su ceja. En período reproductivo varía, en las antillas, posee la cabeza y pecho pálidos marrón-rojizo, cambiando a blanco en su vientre. Su pecho es ligeramente manchado, cambiando a muy manchado en los laterales. En su vuelo se aprecia una mancha blanca que se extiende hasta la espalda. Su sonido es un suave y rápido silbido -tu-tu-tu-. Es observado típicamente en bandadas. Habita principalmente en llanuras costeras cenagosas.





Familia: Scolopacidae

Nombre Científico: *Tringa flavipes*

Nombre Común: Playero con patas amarillas

Mide 25-28 cm (9.75-11"). Su mediano tamaño, finas y distintivas patas amarillo-anaranjadas y pico recto, ayudan a identificar a esta especie. En su vuelo se puede notar su coloración oscura encima con la cubierta superior de la cola, blanca. Su voz usualmente es de una sola nota, de un sonido suave y nasal como -cu-cu-. Se observa típicamente en bandadas. Habita en llanuras fangosas y superficiales tanto en aguas frescas como salobres.





Familia: Scolopacidae

Nombre Científico: *Tryngites subruficollis*

Nombre Común: Playero rojizo

Mide 19-22cm (7.5-8.5"). Es bien identificado por la línea oscura y larga que enmarca sus ojos y se delinea hacia los lados, con su cara limpia de otras marcas. Su pico es fino y negro; su parte inferior es color crema con manchas a los lados extendiéndose desde el pecho hasta debajo de su vientre. Sus patas son amarillas y su pequeña cola no se extiende mas allá de las alas al descansar. Al volar se observan con facilidad las líneas blancas en las alas. Habita en campos, pastizales y áreas de hierbas bajas, incluyendo campos de golf.





Familia: Accipitridae

Nombre Científico: *Buteo jamaicensis*

Nombre Común: Guaraguao

Mide de 48-64 cm (19-25"). Es un halcón grande, frecuentemente observado mientras vuela en las alturas. Posee alas y cola redondeadas. El adulto tiene la parte de arriba marrón oscuro y la parte inferior blanca. Se distingue por el contraste entre la banda oscura de su vientre y su cola rojiza. Su canto es cortante y su voz suena aspera -Kiii-r-r-r-. Se alimenta principalmente de roedores, lagartos, culebras y aves. Se encuentra bien distribuido en la isla, pero le gustan sobre todo los bosques y áreas bien forestadas, tanto en zonas bajas como montañosas. Pone de 2-3 huevos blancos o ligeramente manchados y se reproduce de enero a julio.





Familia: Accipitridae

Nombre Científico: *Buteo ridgwayi*

Nombre Común: Guaraguaíto, Gavilán

Mide de 36-41 cm (14-16"). Se distingue por sus plumas oscuras marrón-grisáceas en la parte superior y partes inferiores grises lavadas color marrón-rojizo. El muslo es rojizo y la cola es rayada negra con blanca. El macho es más gris que la hembra, con una banda brillante rojo-marrón en las alas. La hembra es más marrón con un banda castaña-marrón en su ala, el pecho más claro con más rayas grises en su barriga, y las rayas más marcadas están en la cola. Es endémico de La Hispaniola. Habita en lomas bien forestadas, lomas calizas húmedas y sabanas de palmeras. Pone 2 a 3 huevos cremas, con manchas anaranjadas-rojizas. Se reproduce de marzo a junio.





Familia: Accipitridae

Nombre Científico: *Circus cyaneus*

Nombre Común: Gavilan de Cienagas

Mide de 46-61 cm (18-24"). Su gran tamaño, largas alas y cola, y rabadilla blanca, identifica este halcón. El macho adulto es color azul grisáceo. La hembra adulta es marrón arriba y blanca debajo, con muchas rayas en marrón. El juvenil es marrón arriba y completamente marrón-rojizo por debajo, con rayas marrón oscuras en el pecho. Usualmente vuela muy bajo con una serie de fuertes aleteos distintivos y planean inclinándose. Habita en cienegas, sabanas abiertas, arrozales y pantanos.





Familia: Accipitridae

Nombre Científico: *Pandion haliaetus*

Nombre Común: Güíncho

Mide de 53-61 cm (21-24"). Es un ave migratoria. Se identifica por su cabeza blanca con una franja oscura detrás del ojo y por el contraste de sus plumas primarias inferiores y las oscuras superiores en las alas. Una característica de sus alas al volar es la forma en que se dobla su ala. El ave aparece blanca por debajo con una mancha oscura en el ala. Su voz es una serie de silbidos penetrantes. Este es el único halcón que come pescado en las Antillas. Habita en cuerpos de agua fresca o salada incluyendo manglares, lagunas, lagos, y canales. Pone 3 huevos blancos o blanco-cremoso. Su período de gestación es de abril a junio.





Familia: Cathartidae

Nombre Científico: *Cathartes aura*

Nombre Común: Aura tiñosa

Mide de 68-80 cm (27-32"). Su gran tamaño, negruzca coloración y su pequeña cabeza pelada conforman sus características. Los adultos poseen la cabeza roja pero solo puede ser observada a corta distancia. Tanto los jóvenes como los adultos cantan cerca de sus nidos, produciendo un silbido fuerte y otros sonidos inusuales. Se alimenta de carroña y a veces se reúnen en grandes grupos. Habita en áreas abiertas, pastizales y es frecuente visitante de vertederos de basura. Pone de 1-2 huevos blancos-grisáceos con manchas marrones. Se reproduce de febrero a abril, pero en ocasiones puede reproducirse en cualquier mes del año.





Familia: Falconidae

Nombre Científico: *Falco columbarius*

Nombre Común: Halcón, Halconcito

Mide de 25-34 cm (10-13.5"). Este pequeño halcón se distingue por su parte superior gris oscuro en el macho y marrón oscuro en la hembra. Su parte inferior y cola son rayadas de negro. Cuando esta posado se nota la raya de su pálida y bronceada ceja. En su vuelo es muy velóz y ágil, sus largas y puntiagudas alas y su estrecha cola son puntos de identificación. Su voz es un repetitivo trino, raramente escuchado en las Antillas. Habita en lagos costeros y lagunas donde abundan aves costeras así como en bosques y montes.





Familia: Falconidae

Nombre Científico: *Falco sparverius*

Nombre Común: Cuyaya

Mide de 23-30 cm (9-12"). Se caracteriza por su pequeño tamaño, espalda marrón-rojiza, cola rojiza con un borde negro en la parte inferior y dos líneas en la cara. El color del vientre varía entre blanco y marrón rojizo. En el macho, las alas son azul-grisáceas y en la hembra son marrón-rojizas. Su canto es un alto y agudo -kili-kili-kili-. Habita en tierras bajas y secas, así como zonas forestadas en montañas, pueblos y ciudades. Pone de 2-3 huevos blancos con manchas marrones. Se reproduce de enero a agosto.





Familia: Phasianidae

Nombre Científico: *Numida meleagris*

Nombre Común: Guinea

Mide 53cm (21"). Se distingue por la poco común forma de su cuerpo, su plumaje gris oscuro con puntos blancos y su cuello y cabeza desplumada. Su voz es un cacareo salvaje, casi maníaco. Su hábitat es de tipo bosque seco sobre rocas. Construye sus nidos haciendo agujeros en el suelo. Usualmente pone menos de 15 huevos de color claro.





Familia: Aramidae

Nombre Científico: *Aramus guarauna*

Nombre Común: Carrao

Mide 69 cm (27"). Es un ave completamente marrón con rayas blancas en su plumaje y un pico largo y curvo. Su canto es alto, y se escucha como -carrao!- lo que da significado a su nombre local. Habita en pantanos de agua fresca, ciénagas, lagos, arrozales, ríos y bosques de tierras altas. Pone de 7-8 huevos de color crema o de un color verde oliva pálido manchados de marrón. Se aparea de junio a octubre.






Familia: Rallidae

Nombre Científico: *Fulica americana*

Nombre Común: Gallareta

Mide de 38-40 cm (15-16"). El adulto es gris blancuzco con el pico y la cubierta debajo de la cola blancos. Presenta una mancha roja en la frente. El juvenil es más pálido que el adulto. Corre sobre el agua para elevarse. Su voz es una variedad de cacareos. Se encuentra frecuentemente en bandadas, nada sacudiendo su cabeza y se sumerge con destreza. Habita principalmente en áreas de aguas frescas abiertas, con mucha vegetación sumergida. Pone de 6 a 12 huevos crema notablemente punteados. Se reproduce de marzo a junio principalmente.





Familia: Rallidae

Nombre Científico: *Fulica caribaea*

Nombre Común: Gallareta Pico Blanco

Mide de 38-40 cm (15-16"). Es identificada por su coloración negra-grisacea, la cubierta debajo de la cola blanca y su frente blanca extendida hasta la corona, que la hace muy diferente de la *Fulica americana*. El juvenil es más pálido que el adulto y vuela corriendo sobre sus patas para elevarse. Su voz es una variedad de cacareos. Se encuentra típicamente en bandadas. Nada sacudiendo su cabeza y se sumerge con habilidad. Habita principalmente en cuerpos de agua fresca abiertos. Pone de 4 a 8 huevos blancos con puntos. Se reproduce todo el año, mayormente desde abril a junio y de septiembre a noviembre.





Familia: Rallidae

Nombre Científico: *Gallinula chloropus*

Nombre Común: Gallareta Pico Rojo

Mide 34 cm (13.5"). En el adulto se puede notar el pico rojo con la punta amarilla. Posee una frente roja y una línea blanca debajo del ala. El juvenil es gris-marrón, no tiene el pico rojo, pero presenta la línea blanca debajo del ala. Su sonido es una variedad de cacareos. Nada con un movimiento característico, sacudiendo su cabeza. Habita en pantanos y canales con plantas acuáticas; también en manglares, lagos y arrozales. Pone de 3 a 9 huevos grises-bronceados con puntos claros. Se reproduce a lo largo de todo el año, pero mayormente de mayo a septiembre.





Familia: Rallidae

Nombre Científico: *Porphyryla martinica*

Nombre Común: Gallareta Azul

Mide 33 cm (13"). El plumaje del adulto es púrpura-azulado, las patas amarillas y la frente blanco-azulada. El juvenil es de un marrón-dorado y se pueden notar sus azuladas alas y sus patas amarillas. Su sonido es un pito alto y melodioso como -klee-klee-, notas guturales y crujidos. Habita en arrozales y pantanos de agua fresca con vegetación densa. Pone de 3 a 12 huevos crema-rosados y punteados. Su período de reproducción es de julio a septiembre.





Familia: Rallidae

Nombre Científico: *Porzana flaviventer*

Nombre Común: Gallito amarillo

Mide 14 cm (5.5"). Es una especie rara de ver, se distingue por su tamaño pequeño y su color pálido amarillo-marrón. Posee una corona negruzca, la ceja blanca-rayada y el pico pequeño. En el vuelo se columpia con las patas e inclina su cabeza. Su canto es un pito medio y constante y un suave pito alto como -piip-. Es raro en La Hispaniola. Es observado en las orillas de cienagas superficiales, a corta distancia de la vegetación. Habita en pantanos de agua fresca y canales bordeados de plantas acuáticas. Pone de 3 a 5 huevos de coloración crema pálido con puntos color marrón o lavanda. Se reproduce de marzo a junio.





Familia: Corvidae

Nombre Científico: *Corvus leucognaphalus*

Nombre Común: Cuervo

Mide de 48-51cm (19-20"). Es un ave endémica y común de la Hispaniola; su población parece encontrarse amenazada debido a la alteración del hábitat y su caza. Su plumaje es negro completo tiene un pico largo y grueso. Sus partes superiores poseen un brillo violeta. Su canto posee una gran variedad de vocalizaciones, incluyendo gorjeos y graznidos.





Familia: Coerebinae

Nombre Científico: *Coereba flaveola*

Nombre Común: Cigüita Común, pinchita

Mide 10-12.5 cm (4-5"). El adulto en la mayoría de sus formas posee el pico curvo, cejas blancas y una mancha amarilla en el ala y en su pecho, el vientre y rabadilla amarillos. Su garganta varía desde blanco hasta negro. El juvenil es pálido, una versión más clara del adulto y tiene las cejas amarillentas. Emite un fino y alto silbido como -tzi-tzi-tzi-....en una sola nota. Habita virtualmente en todas partes, a excepción de las cimas de las montañas y en tierras bajas muy secas. Pone de 2 a 4 huevos blancuzcos con un tinte rojizo abigarrado de marrón. Su período reproductivo dura todo el año, pero aumenta entre marzo y junio.





Familia: Dulidae

Nombre Científico: *Dulus dominicus*

Nombre Común: Cigüa palmera

Mide 20 cm (8"). Plumaje superior marrón oscuro; partes de abajo de coloración blanca con muchas rayas marrones. Es endémico de la Hispaniola. Emite una variedad de notas y sonidos ruidosos, especialmente alrededor de sus nidos. Habita principalmente en sabanas con palmeras reales, pero también en áreas abiertas con árboles dispersos. Es el ave nacional de la República Dominicana y se alimenta principalmente de frutas. Pone de 2-4 nidos blancos, muy manchados de gris púrpura, especialmente en los extremos. Se reproduce de marzo a junio.





Familia: Emberizinae

Nombre Científico: *Loxigilla violacea*

Nombre Común: Gallito prieto

Mide de 15-18 cm (5.75-7"). El macho adulto es negro, con las cejas, la garganta y la parte inferior de la cola de coloración roja. La hembra es de un negro empañado. El juvenil es de color marrón olivo con marcas rojo-anaranjado similar al adulto. Su canto es una repetición del chillido de un insecto, -t'ziit, t'siit, t'siit, siit, siit... Habita en matorrales densos y en todas las elevaciones desde bosques secos sobre rocas hasta bosques húmedos, incluyendo pinales y jardines. Pone de 3-4 huevos de un azul blancuzco muy pálido con manchas irregulares de color amarillo-marrón y rojizo- marrón. Se reproduce de marzo a junio.





Familia: Hirundinidae

Nombre Científico: *Petrochelidon fulva*

Nombre Común: Golondrina de Cueva

Mide 5 1/2" (14 cm). Es una golondrina robusta con la cola cuadrada, la parte de arriba color azul metálico con manchas blancas, garganta marrón clara y la frente oscura, casi negra. La parte de arriba, cerca de la cola es color marrón rojizo. Su voz es una serie de chillidos, silbidos y gorjeos. Habita principalmente en áreas abiertas cerca de cuevas y farallones. Pone 4 huevos color rosa-claro con manchas marrones. Se reproduce en colonias, de marzo a julio.





Familia: Hirundinidae

Nombre Científico: *Progne dominicensis*

Nombre Común: Golondrina grande

Mide 20 cm (8"). Un ave de doble coloración. El macho tiene la parte superior, cabeza y garganta azul, barriga y abdomen blancos. La hembra y el juvenil son similares al adulto macho, pero el azul de su parte superior esta reemplazada por un marrón degradado. Su voz es un gorjeo que incluye un alto -twick-twick-, también un melodioso trino y un -churr-. Habita principalmente en pueblos, áreas abiertas, cuerpos de agua fresca y lugares y promontorios costeros. Pone de 2 a 6 huevos blancos y se reproduce de febrero a agosto.





Familia: Icterinae

Nombre Científico: *Quiscalus niger*

Nombre Común: Chinchilín

Mide de 25-30 cm (10-12"). Es residente de las Antillas a lo largo de todo el año. El macho y la hembra presentan un plumaje azul a violeta-negro metálico, cola en forma de V y ojos amarillos. En la hembra la cola es mas pequeña. Los juveniles son de color negro parduzco opaco con la cola plana y color marrón. Emite sonidos variados, incluyendo notas musicales claras, parecidas a gritos de asombro. Habita principalmente en tierras bajas, en todo tipo de áreas abiertas, incluyendo pastizales, zonas residenciales y manglares. Sus huevos son color olivo con manchas oscuras de diferentes colores.





Familia: Emberizinae

Nombre Científico: *Ammodramus savannarum*

Nombre Común: Tumbarroco

Mide 12.5 cm (5"). El adulto tiene marcas doradas en la frente donde están las cejas y una raya blancuzca en el centro de su corona. El juvenil posee una marca más palida en el pico y también una fina raya en el pecho y laterales. Tiene dos canciones distintivas, un largo y fino zumbido seguido de una especie de hipo; y un fino y alto silbido como campanadas. Es más escuchado que visto. Habita en campos y pastizales de alta hierbas. También en arrozales. Pone 3 huevos blancos manchados. Se reproduce principalmente de mayo hasta agosto, pero también en otros meses.





Familia: Emberizinae

Nombre Científico: *Tiaris bicolor*

Nombre Común: Juana Maruca

Mide 11.5 cm (4.5"). El macho tiene la cabeza y partes superiores negras. La hembra y el juvenil son completamente de color castaño oliva. Su voz es un enfático -buzz- que siempre recibe un segundo y más alto esfuerzo. Su llamado es un suave y musical -tsip-. Visita las áreas urbanas de la Republica Dominicana, pero habita en casi todas las áreas abiertas con arbustos, incluyendo los claros de los bosques, las orillas del camino, cañaverales y jardines. Pone 3 huevos blancuzcos muy marcados de rojizo-marrón en el extremo y se reproduce durante todo el año.





Familia: Emberizinae

Nombre Científico: *Tiaris olivacea*

Nombre Común: Cigüita de Hierba

Mide 11.5 cm (4.5"). Las marcas de campo del macho son su distintiva garganta y ceja amarillas y su pecho negro. La hembra y el juvenil son de coloración amarillo oliva, el arco del ojo y la quijada son ligeramente amarillentas. Su voz es usualmente un suave -tik-. Es un ave solitaria o de grupos pequeños de 5 a 6 miembros. Habita principalmente en áreas abiertas sembradas de hierba desde tierras bajas hasta elevaciones moderadas, pero también en las montañas altas donde hay hábitats confortables. Pone 3 huevos azulados blancos marcados en un extremo. Se reproduce durante todo el año.





Familia: Icterinae

Nombre Científico: *Icterus dominicensis*

Nombre Común: Cigüa Canaria, platanero

Mide 20-22 cm (8-8.5"). El adulto es negro por completo con los hombros amarillos. El juvenil posee su parte superior mayormente oliva, su parte inferior de un amarillo palido, alas negras y la garganta a veces blanca o marrón-rojiza. Su llamado es un fuerte y agudo -kiik o chick-. Su canto es hermoso pero muy raramente escuchado. Habita en bosques y jardines, desde la costa hasta medianas elevaciones, particularmente donde las palmas estan disponibles para los nidos. Pone de 3 a 4 huevos blancos con manchas azules. Se reproduce principalmente de marzo a junio, aunque también irregularmente durante todo el año.





Familia: Icterinae

Nombre Científico: *Molothrus bonariensis*

Nombre Común: Pajaro vaquero

Mide 18-20 cm (7-8"). Es un ave de tamaño mediano, coloración oscura y pico cónico. El macho adulto es negro uniforme y brillante con tonos púrpura. La hembra adulta es castaño- grisáceo-marrón en su parte superior y marrón claro en la parte inferior. Sus cejas son tenues. El juvenil se asemeja a la hembra adulta pero sus partes inferiores poseen rayas gris pálido y tiene una línea clara encima del ojo. Su canto consiste en 1 o 2 silbidos, seguidos de un chillido melodioso. Habita en tierras bajas, pero también en montañas con áreas abiertas y cerca de zonas agrícolas donde puede obtener granos. Sus huevos varían de color y marcas. Se reproduce de marzo a julio.





Familia: Estrildidae

Nombre Científico: *Lonchura punctulata*

Nombre Común: Pecho Javado

Mide 11.5 cm (4.5"). El adulto posee una capucha color canela y parte inferior festoneada. El juvenil carece de las marcas del adulto, pero es canela por encima y pálido por debajo. Su canto es un suave silbido como -pit- desvaneciéndose al final. Introducido a la República Dominicana en 1960. Vuela típicamente en bandadas. Habita en tierras bajas de áreas abiertas, hierbas en retoño, así como los bordes de plantaciones de caña de azúcar, zonas agrícolas, orillas del camino, en parques o áreas urbanas. Pone 6 huevos blancos. Se reproduce de junio a octubre.





Familia: Mimidae

Nombre Científico: *Dumetella carolinensis*

Nombre Común: Zorzal Gato

Mide 23 cm (9"). Es un ave completamente gris con una cubierta negra. La cubierta inferior de su cola es marrón-rojizo, larga, frecuentemente levantada. Su voz es un distintivo y suave sonido como -miu-. Su llamado de alarma es -pirt-pirt-pirt-. Su canto es una serie de frase desconectadas incluyendo imitaciones de maullidos y pausas. Muy raro en la Hispaniola, moderadamente tímida y más frecuentemente escuchada que vista. Generalmente forrajea cerca de la tierra. Habita en matorrales densos y árboles pequeños.





Familia: Mimidae

Nombre Científico: *Mimus polyglottos*

Nombre Común: Ruiseñor

Mide de 23-28 cm (9-11"). Ave con plumaje superior gris e inferior blanco-grisáceo, conocida por sus alas y cola marcadas de blanco que al volar son claramente visibles. Los polluelos tienen el plumaje superior marrón-grisáceo. Su voz es una clara y melodiosa serie de frases, repetidas varias veces. Habita en áreas abiertas con arbustos o árboles dispersos, así como zonas semi-áridas, manglares abiertos, jardines y parques. Pone de 3-4 huevos de un pálido verde-azulado, con manchas marcadas en el extremo mas amplio. Se reproduce de enero a junio.





Familia: Muscicapidae

Nombre Científico: *Catharus ustulatus*

Nombre Común: Zorzal Migratorio

Mide 17.5 cm (7"). De coloración grisáceo-marrón encima y blanco-marrón por debajo, con su pecho rayado de castaño y el aro que rodea los ojos, color de crema, lo cual le da una apariencia espectacular. Es un ave muy tímida y vuela rápido tratando de no ser captada por los humanos. Se alimenta en el suelo, pero también forrajea en las palmas. Durante la migración, puede mantenerse en un lugar por 1 o 2 días. Habita en bosques abiertos, árboles de poco crecimiento y jardines.





Familia: Muscicapidae

Nombre Científico: *Turdus plumbeus*

Nombre Común: Chua Chuá

Mide 25-28 cm (10-11"). Se distingue por su coloración gris en la parte superior, patas y pico rojizos, el aro del ojo rojo, y la punta de su cola es blanca. Sus partes inferiores varían desde completamente gris hasta la garganta blanca con rayas negras y abdomen blancuzco. Su voz incluye un alto -wiichei- y un rápido y alto silbido. Habita en bosques elevados, bosque sobre rocas, bosques densos con árboles de poco crecimiento, jardines y plantaciones de café de sombra. Pone de 3 a 4 huevos verde-azul pálidos bien marcados de marrón-rojizo. Se reproduce de enero a septiembre con picos entre abril y julio.





Familia: Parulinae

Nombre Científico: *Dendroica caerulescens*

Nombre Común: Cigüa Azul Garganta Negra

Mide 12-14 cm (4.75-5.5"). El macho es azul por encima con la cabeza negra y una banda negra a los lados con un punto blanco blanco en las alas. En la hembra se nota la fina y blancuzca ceja y un punto blanco en el ala, a veces ausente en las hembras jóvenes. Las partes superiores son marrón-oliva y las inferiores de un crema tenue. Los machos habitan en bosques altos maduros y las hembras en bosques de segundo crecimiento. Habita en bosques, o a orillas de estos, principalmente de montaña, pero también en tierras húmedas. Muy raro en bosques secos.





Familia: Parulinae

Nombre Científico: *Dendroica coronata*

Nombre Común: Cigüa Mirta

Mide 14 cm (5.5"). Se distingue por la combinación de su rabadilla amarilla, la mancha lateral en el pecho, y su garganta blanca. Los machos, en el período reproductivo, poseen el plumaje más vivo y los jóvenes mas tenues. Los adultos, fuera del período reproductivo son de coloración castaña, pero con las mismas características mencionadas. Su voz es un llamado fuerte que se oye como un -chik-. Usualmente es visto en pequeños grupos. Su hábitat cubre un amplio rango, desde jardines y bosques, hasta matorrales y áreas de vegetación dispersa, manglares y orillas de cienagas.





Familia: Parulinae

Nombre Científico: *Dendroica dominica*

Nombre Común: Cigüa Garganta Amarilla

Mide 13 cm (5"). Se puede notar su garganta amarilla, cejas blancas y la mancha blanca en el cuello. La hembra es ligeramente negra y mas pequeña. Su voz es un suave y alto silbido, ligeramente metalico como -tsip-. Generalmente prefiere las ramas más altas de los árboles. Habita en bosques de pino, pinos australianos, bosques de tierras bajas y palmas de coco, asi como también en jardines.





Familia: Parulinae

Nombre Científico: *Dendroica discolor*

Nombre Común: Cigüita de Los Prados

Mide 12 cm (4.75"). Se caracteriza por su parte inferior amarilla, laterales rayados de negro. Tiene el hábito de mover su cola en forma circular. Los adultos en período no reproductivo son más pálidos que en reproducción. La hembra joven es más pálida que la adulta con marcas faciales blancas en vez de amarillas. El macho en reproducción posee las partes inferiores amarillo brillante con distintivas rayas negras. Habita en bosques costeros secos, matorrales, pastizales con árboles dispersos, manglares y jardines.





Familia: Parulinae

Nombre Científico: *Dendroica magnolia*

Nombre Común: Cigüita Magnolia

Mide 11.5-12.5 cm (4.5-5.25"). Se distingue por tener marcas blancas en la cola, las cejas y la raya del ala de color blanco, y la garanganta y rabadilla amarilla. El adulto y el juvenil poseen las cejas pálidas, el aro alrededor del ojo blanco, la cabeza gris y las partes inferiores amarillas con una banda crema cruzando el pecho. El macho en período reproductivo tiene las mejillas negras y las partes inferiores muy manchadas de negro. La hembra en período reproductivo es más pálida, con mejillas grises y las partes inferiores moderadamente manchadas. Habita en bosques abiertos en tierras bajas, en las orillas y arbustos de lagunas y a veces en jardines.





Familia: Parulinae

Nombre Científico: *Dendroica palmarum*

Nombre Común: Cigüita Palmar

Mide 12.5-14 cm (5-5.5"). Se caracteriza por tener el hábito de mover la cola en forma circular. Fuera del período reproductivo la cubierta inferior de su cola es amarillenta, su rabadilla es color oliva, las cejas tenues y la espalda castaña. Cuando está en período reproductivo, la corona es de color marrón-rojizo. Habita generalmente en matorrales o en arbustos cerca de cuerpos de agua costeros, incluyendo manglares. También en áreas abiertas, incluyendo campos de golf y a orillas de plantaciones y jardines.





Familia: Parulinae

Nombre Científico: *Dendroica petechia*

Nombre Común: Canario de Manglar

Mide 11.5-13.5 cm (4.5-5.25"). El macho adulto es amarillo por completo, incluyendo las manchas en las plumas exteriores de la cola. Su parte superior es amarillo verdoso, con variadas cantidades de coloración marrón-rojiza en la cabeza. La manchas en la parte inferior, son tenues o están ausentes en la hembra adulta y no tiene coloración marrón-rojiza en la cabeza. Su voz es variable pero alta, clara y rápida y se oye como -suit-suit-suit-ti-ti-ti-uit-. Habita sobre todo en manglares, y en bosque costero sobre rocas. Pone de 2 a 3 huevos blanco-azulados con manchas marrones en forma de guirnalda en la parte más larga. Se reproduce de marzo a julio.





Familia: Parulinae

Nombre Científico: *Dendroica striata*

Nombre Común: Cigüita Caco Prieto

Mide 12.5-14 cm (5-5.5"). El macho y el juvenil fuera del período reproductivo poseen una raya blanca en las alas y en la cubierta interior de su cola, son ligeramente rayados en los laterales, en general, son gris-amarillento por encima y pálidos por debajo. El macho en reproducción tiene la cubierta negra y una mancha blanca en las mejillas. La hembra en reproducción es similar al adulto fuera de reproducción, pero su plumaje es más gris-oliva que gris-amarillento. Su voz es un fino y alto silbido como -ziit-ziit-ziit-. Su hábitat es variado, incluyendo manglares, arbustos, bosques sobre rocas y áreas abiertas con árboles dispersos.





Familia: Parulinae

Nombre Científico: *Dendroica tigrina*

Nombre Común: Cigüita Tigrina

Mide 12.5-14 cm (5-5.5"). Se identifica por la marcada raya en el pecho y su amarillenta rabadilla. Usualmente tiene una mancha amarilla en el cuello. El macho adulto posee las mejillas marrón-rojizas y tiene una mancha larga y blanca en las alas. La hembra adulta es mas tenue, las mejillas son gris-oliva, tiene una sola raya blanca en las alas, una mancha cremosa detrás de las mejillas y la rabadilla amarillenta. Raramente emite su susurrado canto que suena como -tsiit-tsiit-tsiit-. Habita desde bosques montañosos incluyendo plantaciones de café de sombra, hasta matorrales costeros, manglares y jardines. Es observada en casi todo lugar donde hay plantas florecidas.





Familia: Parulinae

Nombre Científico: *Dendroica virens*

Nombre Común: Cigüita Pechinegro

Mide 12.5 cm (5"). Se caracteriza por su coloración gris-amarillenta en las mejillas, las cuales están rodeadas por una banda amarilla. El macho adulto tiene la quijada, garganta y parte superior del pecho negro, con los laterales rayados de negro. La hembra adulta y el macho juvenil son más pálidos y poseen la quijada amarillenta, no son negros en la parte inferior a excepción de las rayas en sus laterales. Forrajea activamente por insectos y orugas. Habita principalmente en bajas y medianas elevaciones de áreas forestadas, incluyendo plantaciones de café de sombra, a veces en bosques y jardines durante la migración.





Familia: Parulinae

Nombre Científico: *Helmintherus vermivorus*

Nombre Común: Cigüita Cabeza Rayada

Mide 14 cm (5.5"). Sus marcas de campo son su coloración gris-verdosa en la parte superior, en las alas y en la cola; su cabeza crema con rayas negras desde la corona al ojo y sus partes inferiores son crema claro, tanto en la garganta como en la barriga. El residente en La Hispaniola es el que no se encuentra en periodo reproductivo. Forrajea en hojas secas de todas las elevaciones. Se asocia con bandadas de especies diferentes. Habita en bosques densos en elevaciones.





Familia: Parulinae

Nombre Científico: *Mniotilta varia*

Nombre Común: Pega Palo

Mide 12.5-14 cm (5-5.5"). Se caracterizan por su coloración negra y blanca, y corona rayada de blanco y negro. Tiene el hábito de escalar los troncos de los arboles. El macho tiene una mancha negra en las mejillas. La hembra es de alguna manera más blanca que el macho, particularmente en las mejillas, garganta y laterales. Su voz anuncia su llegada en agosto o septiembre, raramente canta antes de su partida. Su llamado es un fino -tii-zii, tii-zii- variando en longitud. Escala los arboles tanto hacia arriba como abajo buscando insectos y arañas. Habita en bosques de todas las elevaciones.





Familia: Parulinae

Nombre Científico: *Parula americana*

Nombre Común: Cigüita Parula

Mide 10.5 -12 cm (4 - 4.75"). Azul grisacea por encima, con la espalda de un color verde amarillento, la garganta y el pecho son amarillos, tiene rayas blancas en las alas. Posee un aro alrededor del ojo color blanco, que no llega a cerrarse completamente. Su canto es una especie de subido ascendente, parecido al de un insecto, que termina en una nota aguda. Habita en bosques secos sobre rocas en tierras bajas pero tambien en bosques humedos sobre montañas forestadas.





Familia: Parulinae

Nombre Científico: *Protonotaria citrea*

Nombre Común: Cigüita Cabeza Amarilla

Mide 13.5 cm (5.25"). El macho es de un amarillo oro en todo su cuerpo, excepto por sus alas y cola de azul-grisáceo. La hembra es más pálida especialmente en la corona y la nuca. La coloración amarillo oro se encuentra en la cara, la garganta y el pecho. Esta cigüa es muy fácil de identificar debido a la similitud en apariencia y del hábitat con el Canario de Manglar. Habita dentro o cerca de lagunas de manglares.





Familia: Parulinae

Nombre Científico: *Seiurus aurocapillus*

Nombre Común: Cigüita Saltarina

Mide 14-16.5 cm (5.5-6.5"). Sus partes superiores son castaño-oliva, su corona anaranjada esta bordeada de rayas negruzcas, el arco de su ojo es bien delineado de blanco. Sus partes inferiores son muy marcadas y posee rayas largas y oscuras. La hembra es mas pálida que el macho. Es una especie terrestre, que forrajea en la hojarasca con su cola levantada. Habita principalmente en arboledas y en el suelo de bosques primarios, frecuentemente cerca de arroyos y charcas.





Familia: Parulinae

Nombre Científico: *Seiurus motacilla*

Nombre Común: Cigüita de Río

Mide 14.5-16 cm (5.5-6.25"). Es de un color marrón-grisáceo oscuro encima y blanco debajo con rayas marrones oscuras. Sus marcas de campo son sus cejas blancas, más anchas detrás del ojo, y la ausencia de rayas en la garganta. Tiene el hábito de sacudirse y moverse constantemente. Su voz es un llamado agudo como -chink-, ligeramente alto en silbido y con más tintineo. Es un ave terrestre y camina y forrajea de una manera similar a la Cigüita de Agua. Habita a orillas de corrientes de agua fresca, frecuentemente en elevaciones altas, también en lagos subterráneos en zonas cársticas, y hasta en charcos de agua estancada de la lluvia.





Familia: Parulinae

Nombre Científico: *Seiurus noveboracensis*

Nombre Común: Cigüita de Agua

Mide 12.5-15 cm (5-5.75"). Es de coloración marron-oliva por encima y crema pálido debajo, con rayas marrones oscuras. Se puede notar la ceja crema y prominente, la cual se estrecha detrás del ojo y la fina raya marrón nequzca en la garganta. Tiene el hábito de sacudirse y moverse constantemente. Su voz es un llamado reconocible agudo y enfático como -tchi-. Es un ave terrestre y doméstica, se alimenta caminando a lo largo de la orilla del agua, sacudiéndose, moviéndose y parándose a recoger insectos o larvas del fango. Habita en el borde de agua estancada, principalmente salina, dentro o cerca de manglares y bosques costeros sobre rocas.





Familia: Parulinae

Nombre Científico: *Setophaga ruticilla*

Nombre Común: Vijiřita

Mide 11-13.5 cm (4.25-5.25"). El macho adulto posee la parte superior, garganta y pecho negros y una larga mancha en las alas y a los lados de la cola de color naranja. La hembra adulta posee la cabeza gris, las partes superiores gris-verdosa, y una mancha larga en las alas y en la cola de color amarillo. El juvenil tiene la cabeza gris verdosa y las manchas amarillas son pequeñas. Frecuentemente pone sus alas y cola en forma de abanico. Habita usualmente en bosques costeros y montañosos, también en jardines y bosques secos sobre rocas.





Familia: Parulinae

Nombre Científico: *Wilsonia citrina*

Nombre Común: Cigüita Gorra Negra

Mide 12.5-14.5 cm (5-5.75"). Tiene el hábito de aletear y poner su cola en forma de abanico, mostrando así las plumas blancas exteriores de la cola. El macho tiene la parte superior, sus alas y cola mayormente verde oliva, la frente y mejillas amarillas, la corona negra, el cuello y garganta en forma de capucha, y el pecho y barriga amarillos. La hembra adulta es similar al macho pero su capucha negra es menos notoria. La hembra joven carece de capucha negra, su cabeza amarilla está agudamente marcada de verde oliva en la corona y en la nuca. Habita en bosques húmedos de bajo crecimiento y cienagas de manglares.





Familia: Passeridae

Nombre Científico: *Passer domesticus*

Nombre Común: Gorrión

Mide 15 cm (5.75"). El macho se distingue por poseer el pecho negro, corona gris y mejillas pálidas. La hembra y el juvenil son de coloración crema en las cejas y partes superiores marrones rayadas de negro. Su llamado es un distintivo -chirp-. Se encuentra en las áreas urbanas, donde se ha esparcido en las últimas 2 décadas. Se alimenta principalmente en el suelo, anda típicamente en bandadas y es extremadamente domesticable. Pone de 3 a 5 huevos blancos con rayas pequeñas grises o marrones. Se reproduce durante todo el año pero principalmente de marzo a septiembre.





Familia: Ploceidae

Nombre Científico: *Ploceus cucullatus*

Nombre Común: Madame Sagá

Mide 17 cm (6.75"). El macho es naranja-amarillo por completo con una capucha negra y el iris rojo. La hembra generalmente de color verde amarillento en la cara y el pecho, con rayas amarillas en sus alas. Su voz es un silbido musical de llamadas. Durante el período de reproducción el macho suele abrir sus alas cerca del nido, a veces colgado con la cabeza hacia abajo. Es una vista espectacular cuando varios machos realizan esta acción simultáneamente. Habita en tierras bajas y arrozales, donde hay vegetación cerca del agua, arboledas abiertas y bosques sobre rocas. Pone de 2 a 4 huevos de diferentes colores. Se reproduce en diciembre.





Familia: Thraupinae

Nombre Científico: *Euphonia musica*

Nombre Común: Jilguerillo

Mide 12 cm (4.75"). Pequeña ave compacta con una corona y nuca de color azul cielo. En el macho los colores varían desde predominantemente verde hasta oscuro por arriba y amarillo anaranjado por debajo, y en su rabadilla y frente. La garganta es de color violeta oscuro. La hembra es más pálida, completamente verde encima y verde amarillento por debajo, con la rabadilla y frente amarillas. Su voz es un rápido y suave -ti-tit-, a veces en 1 o 3 sílabas y un fuerte y metálico -chink-chink-. Habita en bosques densos desde tierras bajas hasta cimas de montañas. Pone 4 huevos blancos manchados de rojizo o púrpura. Se reproduce de enero a julio





Familia: Thraupinae

Nombre Científico: *Phaenicophilus palmarum*

Nombre Común: Cuatro ojos

Como la otra especie, también mide 18 cm (7"). Las dos son sumamente parecidas; plumaje verde-amarillento. El abdomen es gris, aclarando por el cuello, hasta ser blanco. Esta especie tiene la corona negra. Su sonido es nasal, -pi-eiu-. Su hábitat es más numeroso en zonas semiaridas, pero aparecen en donde quiera que haya árboles, desde pueblos hasta bosques densos. Pone de 2-3 huevos de blanco a gris pálido. Se reproduce de abril a junio.





Familia: Parulinae

Nombre Científico: *Spindalis zena*

Nombre Común: Cigüa amarilla

Es endémica de la Hispaniola, donde es común en las montañas y menos común en las costas. Mide 16.5 cm (6.5"). Existe una notable diferencia entre ambos sexos. Masculino: se distingue por su cabeza negra con entradas blancas, partes inferiores amarillas, y pecho marrón rojizo. Femenino: posee partes superiores marrón olivo y partes inferiores rayadas de blanco. Su canto es débil. Habita en pinares, montes y manglares. Pone de 2-3 huevos de coloración crema a verde azulado pálido. Se reproduce más de una vez al año, principalmente de abril a junio.





Familia: Tyrannidae

Nombre Científico: *Contopus hispaniolensis*

Nombre Común: Maroita

Mide 15-16 cm (5.75-6.25"). Ave pequeña que atrapa su presa mientras vuela. Su coloración es gris-oliva en la parte superior, más oscura en la cabeza, las partes inferiores gris y oliva-amarillas o marrón. Las rayas de sus alas son poco notorias o están ausentes. La mandíbula es pálida en la base. Tiene el hábito de sacudir la cola al aterrizar. Su voz es un fuerte y triste -purr, pip-pip-pip-. Es endémico de La Hispaniola. Su hábitat es variado, e incluye pinares y bosques con árboles de hojas anchas, plantaciones de café de sombra y huertos. Pone de 2 a 4 huevos de color crema con tintes rosados, y manchas marrón-rojizas y grises. Se reproduce de mayo a junio.





Familia: Tyrannidae

Nombre Científico: *Myiarchus stolidus*

Nombre Común: Manuelito

Mide 20 cm (8"). Tiene la garganta y el pecho blancuzco, su abdomen y barriga poseen una coloración amarilla palida y su pico es negro. Su cola marrón tiene una trama rojiza. Su canto es un prolongado,-whii-ii-ii, swii-ip, bzzrt-. Habita en bosques de tierras bajas y a orillas de estos; montes áridos, bosques secos sobre rocas y manglares. Pone de 3-4 huevos amarillo pálido, manchados de marrón oscuro. Se reproduce de abril a junio.





Familia: Tyrannidae

Nombre Científico: *Tyrannus caudifasciatus*

Nombre Común: Manjulia

Mide 24-26 cm (9.5-10"). Oscura por encima y blanca por debajo. La corona es enteramente oscura con una rara mancha amarilla o anaranjada. Su llamada es variable, usualmente alta y se oye como -bzzi-biip o bii-sip; yoiú-bī-biip-. Habita en zonas maderables tanto secas como húmedas, tales como pinares, plantaciones de café, manglares y áreas de bajas a medianas elevaciones forestales. Pone de 2-4 huevos de color marrón rojizo con manchas oscuras marrones y marcas violetas en el extremo más ancho. Se reproduce generalmente de febrero a julio, pero puede darse el caso de que lo hagan también entre noviembre y enero.





Familia: Tyrannidae

Nombre Científico: *Tyrannus dominicensis*

Nombre Común: Petigre

Mide de 22-25 cm (8.5-10"). Se caracteriza por tener la parte superior gris, y la parte inferior gris clara, casi blanca-blanca y una máscara oscura alrededor de los ojos. La mancha amarillo-anaranjada de su corona, es raramente visible. Su canto se oye -pi-tirr-ri, pi-ti-ríi, pi-ti-rro-. Habita tanto en las montañas como en tierras bajas, y en áreas abiertas con arboles dispersos. Usualmente se observa posada sobre líneas telefónicas y topes de arboles descubiertos. Pone de 2-4 huevos entre rosado y rojo. Se reproduce de abril a junio.





Familia: Vireonidae

Nombre Científico: *Vireo altiloquus*

Nombre Común: Julian Chiví

Mide de 15-16.5 cm (5.75-6.5"). Es más identificado por su canto. Se caracteriza por su ceja blancuzca, una oscura línea alrededor del ojo, una línea negra que nace bajo el pico y cruza su cara como una barba y la ausencia de una barra de vuelo. Cuando es adulto su iris es rojo. En el juvenil, el iris es marrón, al igual que su plumaje. Su voz es un sonido monótono consistente en melodiosas frases de tres sílabas que dan origen a su nombre común -julián chiví-. Habita en bosques de todo tipo y elevaciones, así como en manglares. Pone de 2-3 huevos rosados blancuzcos. Se reproduce de mayo a junio.





Familia: Fregatidae

Nombre Científico: *Fregata magnificens*

Nombre Común: Tijereta

Mide de 94 a 104 cm (37-41"). Su larga y bifurcada cola y sus puntiagudas alas que tienden a flotar inmóviles en el aire facilitan su identificación. El macho adulto es completamente negro. Durante el cortejo, su garganta se infla y se enrojece. La hembra adulta es negra por completo con el pecho blanco. Son silenciosos, excepto durante el cortejo. Habita en bahías, costas y cayos, y a veces tierra adentro, especialmente durante las tormentas. Pone un solo huevo blanco. El período de reproducción es variable, ocurriendo usualmente durante agosto y abril. Sin embargo, también puede aparearse entre noviembre y febrero.





Familia: Phaethontidae

Nombre Científico: *Phaethon lepturus*

Nombre Común: Rabijunco

Incluyendo las plumas de la cola, mide 81cm (31"). Excuyendo las plumas de la cola mide 37-40cm (15-16"). El adulto es completamente blanco con plumas largas en su cola y manchas negras en las alas primarias. Su pico es amarillo o anaranjado. El juvenil es manchado de negro en su espalda, de pequeñas plumas centrales en su cola, su pico es amarillento. Su canto es un áspero -crick-it-. Fácilmente observado sobrevolando cerca de rísco y farallones, en donde usualmente se reproduce. Habita muy afuera en el mar excepto cuando visita los rísco para anidar. Se aparea principalmente de marzo a julio, aunque a veces antes.





Familia: Phalacrocoracidae

Nombre Científico: *Phalacrocorax auritus*

Nombre Común: Corúa

Mide de 74-89 cm (29-35"). Se distingue por su gran tamaño, cuello largo, pico encorvado y el hábito de posarse con las alas abiertas. El adulto presenta una apariencia totalmente negra. En época de reproducción, le aparece una especie de moño en la oreja. El juvenil es marrón encima y pálido por debajo. Es generalmente silencioso, pero en época de reproducción emite una variedad de gruñidos guturales. Habita en las tierras de los lagos y zonas costeras protegidas, más frecuentemente en aguas saladas. Pone de 3 a 4 huevos de color azul verdoso con marcas marrones en un lado. Su período reproductivo es de abril a junio y en octubre.





Familia: Sulidae

Nombre Científico: *Sula leucogaster*

Nombre Común: Bubí

Mide de 71-76 cm (28-30"). En el adulto la cabeza es completamente marrón y las partes superiores están agudamente demarcadas desde su blanca barriga hasta su abdomen. El juvenil es de un marrón claro en su barriga y abdomen. Su canto es un ronco -keik-. Habita en bahías, áreas costeras y en los mares. Pone 1-2 huevos blancos. La temporada de reproducción es prolongada y varía año con año, pero generalmente lo hace de marzo a junio y de septiembre a octubre.





Familia: Phoenicopteridae

Nombre Científico: *Phoenicopus ruber*

Nombre Común: Flamenco

Mide de 107-122 cm (42-48"). El adulto es de color anaranjado y rosado, patas y cuellos largos, y extraordinario pico curvo. El juvenil es más pálido que el adulto. En el vuelo estira e inclina la cabeza y el cuello, y se pueden observar las plumas negras de sus alas. Su sonido distintivo es parecido al graznido del ganso. Vuela típicamente en bandadas, a veces viaja a grandes distancias en busca de un hábitat adecuado. Habita en lagunas superficiales y estuarios costeros de altas salinidades. Ponen 1 huevo blanco y se reproducen principalmente de marzo a julio.





Familia: Picidae

Nombre Científico: *Melanerpes striatus*

Nombre Común: Carpintero

Es endémico de la Hispaniola. Mide de 22-25 cm (8.5-10"). Tiene el abdomen de color oliva y el plumaje superior amarillo verdoso con rayas horizontales negras. Tiene unas manchas blancas y negras en la parte inferior del cuello y coloración roja más arriba del cuello y en las plumas superiores de la cola. Su tono de alarma a agresiones es un -wup- y -tei-ei-. Tiende a formar colonias de nidos conformadas por más de una docena de parejas en un mismo árbol. Habita en colinas parcialmente boscosas parcialmente cultivadas y palmas. Pone de 4-6 huevos blancos. Se reproduce principalmente de febrero a julio.





Familia: Picidae

Nombre Científico: *Nesocittes micromegas*

Nombre Común: Carpinterito de Sierra

Mide 13-16 cm (5-6.25"). Es un pequeño y típico carpintero. El adulto es de color oliva por encima y amarillo pálido con manchas oscuras por debajo, con la corona amarilla. El macho adulto tiene una mancha roja brillante en el centro de su corona. La hembra adulta es significativamente mas larga que el macho y carece de la mancha roja en su corona. El joven es de un verde palido por encima y con amarillo pálido en su corona, su abdomen es mas manchado. Su voz es como un -kuk-ki-k-ki-kii-ku-kuk- sorpresivamente alto para esta diminuta ave. Habita tanto en bosques secos como húmedos y manglares. Pone de 2 a 4 huevos blancos y se reproduce de marzo a julio.





Familia: Podicipedidae

Nombre Científico: *Podylimbus podiceps*

Nombre Común: Zaramagullón

Mide de 30-38 cm (12-15"). Este pato se distingue por su pico cónico y su coloración grisacea-marrón. El adulto al aparearse presenta la garganta negra y el pico con una banda blanca. Cuando no se está apareando presenta la garganta blanca y su pico carece de la banda blanca. Su sonido es un distintivo -kowp, kowp, kowp-, bien despacio al final. Habita principalmente en aguas frescas, pero también en lagunas salobres. Pone de 2-6 huevos blancuzcos. Se reproduce durante todo el año, pero principalmente de marzo a julio.





Familia: Podicipedidae

Nombre Científico: *Tachybaptus dominicus*

Nombre Común: Tigua

Mide de 23-26 cm (9-10"). Se distingue por su pequeño tamaño, coloración negruzca, fino pico y su iris amarillo-anaranjado. La mancha blanca en su ala es una buena marca de campo, pero no siempre es visible. Su voz, es un ascendente -wiik-. Es generalmente un ave solitaria o de grupos de pequeñas familias. Frecuentemente se posa entre la vegetación donde es muy difícil de observar. Habita principalmente en cienagas de aguas frescas y pequeños pantanos con plantas acuáticas. También en charcas temporales formadas después de fuertes lluvias. Pone de 1-7 huevos blancuzcos, apareándose durante el año.





Familia: Hydrobatydae

Nombre Científico: *Oceanodroma leucorhoa*

Nombre Común: Lavapiés

Mide 20 cm (8") Es una pequeña ave acuática de coloración marrón-negruzca y un trasero blanco. Habita en las afueras de los mares.





Familia: Psittacidae

Nombre Científico: *Amazona ventralis*

Nombre Común: Cotorra Dominicana

Mide de 28-31 cm (11-12"). Endémica de la Hispaniola. Es conocida por su plumaje verde brillante, su frente blanca y por sus manchas negras en las mejillas. En el abdomen tiene el plumaje rojo-anaranjado. Sus llamados consisten en altos -quawks y creechs-. Usualmente viaja en parejas o en bandadas. Se encuentra en todas las elevaciones de los bosques, más abundante en zonas maderables y donde puedan encontrarse frutas y semillas. Anida en cavidades de los arboles como los hoyos de los Carpinteros. Pone de 2-4 huevos blancos. Se reproduce de febrero a junio.





Familia: Psittacidae

Nombre Científico: *Aratinga chloroptera*

Nombre Común: Perico

Mide 30-33 cm (12-13"). Es un periquito largo. Su cuerpo es de un verde brillante, cola larga y terminada en punta, oídos blancos, y borde rojo en la banda de sus alas que se observa fácilmente en el vuelo. Su voz es como un chillido al volar. Es endémico de la Hispaniola, incluyendo sus islas adyacentes. Habita en montañas forestadas y tierras bajas. Pone de 3 a 4 huevos blancos, reproduciéndose de febrero a junio.





Familia: Tytonidae

Nombre Científico: *Tyto alba*

Nombre Común: Lechuza blanca

Mide de 30-43 cm (12-17"). Es un búho nocturno grande. Su cara es plana y en forma de corazón, y tiene los ojos oscuros y grandes. Es de coloración pálida, con las partes de arriba marrón-anaranjado Algunos son más oscuros, con las partes de arriba marrón-grisáceo oscura, y el pecho y vientre marrón pálidos. Emite una especie de grito fuerte, como -Escriich-, también hace fuertes -Clic-Clic-. Habita en una amplia variedad de áreas abiertas, desde la costa a las montañas, incluyendo arrozales y bosques. Pone de 2-8 huevos blancos y se reproduce todo el año, pero principalmente de agosto a abril.





Familia: Tytonidae

Nombre Científico: *Tyto glaucops*

Nombre Común: Lechuza común

Midiendo 35 cm (14"). Es un búho rojizo, largo, con una cara grisplateada, en forma de corazón. Su canto no es más que un grito que silba, introducido por una serie de tecleos agudos. Habita en bosques abiertos en su mayoría bosque seco o costero sobre rocas. Pone de 4-7 huevos blancos, y se reproduce de enero a junio.

